

## Themenheft 40 – Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen

Ergänzende Wertetabellen zu den Abbildungen

Stand: 2008



Abbildung 1, Seite 12

Anteil der Alkoholkonsumenten oberhalb der Grenzwerte von 20 g/Tag für Männer und 10 g/Tag für Frauen nach Altersgruppen

Quelle: Ernährungssurvey im Bundes-Gesundheitssurvey 1998 [38]

Altersgruppe	Männer	Frauen
18–24 Jahre	23,8 %	11,0 %
25–34 Jahre	25,7 %	13,6 %
35–44 Jahre	34,1 %	18,0 %
45–54 Jahre	38,8 %	22,3 %
55–64 Jahre	31,2 %	17,3 %
65–79 Jahre	29,2 %	10,5 %

Abbildung 2, Seite 18

Entwicklung der altersstandardisierten Mortalitätsrate für alkoholbedingte Erkrankungen von 1980 bis 2005 für Männer und Frauen

Standardisierte Mortalitätsrate auf 100.000

Quelle: [73]

Jahr	Männer	Frauen	Insgesamt
1980	19,5	5,6	12,1
1981	20,1	5,6	12,4
1982	19,1	5,7	12,0
1983	19,0	5,5	11,8
1984	19,0	5,5	11,9
1985	19,5	5,7	12,2
1986	20,1	6,0	12,7
1987	21,0	6,4	13,4
1988	23,0	6,8	14,6
1989	24,0	7,3	15,4
1990	26,2	8,3	17,1
1991	29,8	9,4	19,4
1992	29,8	9,6	19,5
1993	30,7	9,9	20,2
1994	31,4	10,1	20,7
1995	31,1	10,1	20,6
1996	31,0	10,2	20,7
1997	30,7	10,2	20,5
1998	29,0	10,2	19,7
1999	28,1	9,7	19,1
2000	27,5	9,4	18,7
2001	26,7	9,4	18,3
2002	27,5	9,5	18,8
2003	27,2	9,5	18,6
2004	25,9	9,0	17,8
2005	25,6	9,0	17,6

Abbildung 3, Seite 19

Entwicklung des durchschnittlichen Sterbealters von 1980 bis 2005 für Männer und Frauen mit alkoholbedingten Erkrankungen

Quelle: [73]

Jahr	Männer	Frauen	Insgesamt
1980	52,7	54,2	53,1
1981	53,0	53,6	53,1
1982	52,9	54,0	53,2
1983	53,2	54,7	53,6
1984	53,4	54,6	53,7
1985	53,7	55,2	54,1
1986	54,0	55,4	54,3
1987	53,9	55,4	54,3
1988	54,1	55,4	54,4
1989	54,2	55,3	54,5
1990	54,2	55,4	54,5
1991	53,9	55,5	54,3
1992	54,1	55,3	54,4
1993	54,2	55,8	54,6
1994	54,6	56,3	55,0
1995	55,0	56,3	55,3
1996	55,3	56,6	55,7
1997	55,8	57,2	56,2
1998	56,5	58,7	57,1
1999	56,6	58,7	57,1
2000	56,7	58,1	57,1
2001	57,3	58,7	57,7
2002	57,5	58,7	57,8
2003	57,7	59,2	58,1
2004	57,9	59,5	58,3
2005	58,1	59,5	58,4