




Maßnahmen bei Verdacht auf Ebolafieber

Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte

Erstverdacht







Patientin oder Patient stellt sich bei Ihnen vor mit

Fieber >38,5° C oder

erhöhter Temperatur und Ebolafiebertypischen Begleitsymptomen:

- Durchfall
- Übelkeit
- Erbrechen
- Hämorrhagien ...







Sie haben den Erstverdacht, dass es sich um Ebolafieber handeln könnte.

Befragung

Eigenschutz bei Befragung
Abstand halten >1m

Eigenschutz bei Untersuchung:
doppelte Handschuhe, Schutzbrille oder Gesichtsschild, Einmal-Schutzkittel, FFP3-Maske, Fußschutz



Innerhalb von 21 Tagen vor Beginn der ersten Symptome





Aufenthalt in Epidemie-Gebiet und dort Kontakt zu Personen, die an Ebolafieber erkrankt oder verstorben sind, bzw. zu deren Körperflüssigkeiten?

Kontakt mit Flughunden, Fledermäusen, Affen oder deren Ausscheidungen in Epidemie-Gebieten?

Kontakt mit oder Verzehr von Bushmeat aus Epidemie-Gebieten?

Arbeit mit Ebolaviren oder erregertauglichem Material?

Aktuelle Liste der Epidemie-Gebiete unter www.rki.de/ebola

Eine Frage mit „Ja“ beantwortet?

Alle Fragen mit „Nein“ beantwortet


Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt

Gesundheitsamt kann den Verdacht entkräften

Gesundheitsamt bestätigt, dass der Verdacht begründet ist

Begründeter Verdachtsfall

Isolation und Erstversorgung




Eigenschutz
Vollschutz

Patientin bzw. Patienten in Sonderisolierstation verlegen

Gesundheitsamt übernimmt die Kontaktaufnahme zur Sonderisolierstation


Verlegung erfolgt



Sonderisolierstation

Verlegung zur Zeit nicht möglich

Isolation und weitere Versorgung



Eigenschutz
Vollschutz

Diagnostik

- Probenahme
- Verpackung
- Versand

Abstimmung, wann Verlegung in Sonderisolierstation möglich ist

Verlegung erfolgt



Labor
EBOV-Diagnostik

EBOV nachgewiesen

EBOV nicht nachgewiesen


48 h nach Symptombeginn

Maßnahmen



Desinfektion

- Hände
- ggf. Haut, Augen, Schleimhaut



Desinfektion

- Flächen
- Medizinprodukte
- Raumdesinfektion



Abfallentsorgung



Entsorgung von Stuhl und Urin



Wäsche

- Entsorgung
- Desinfektion



Umgang mit Leichen


Bestätigter Fall



Ebolafieber-spezifischer Eigenschutz

Ebolafieber-spezifische Schutz- und Versorgungsmaßnahmen gemäß Rahmenkonzept Ebolafieber

Verdacht nicht bestätigt



Kein Ebolafieber-spezifischer Eigenschutz

Keine Ebolafieber-spezifischen Schutz- und Versorgungsmaßnahmen