

Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen (§ 34, Abs. 11 IfSG)

Deutschland


2014

ROBERT KOCH INSTITUT






Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2004/2009/2014






Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Alte und Neue Bundesländer, D gesamt




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2007-2014 – neu eingeführte Impfungen



Abkürzungen der Bundesländer

Landesname	Abkürzung
Baden-Württemberg	BW
Bayern	BY
Berlin	BE
Brandenburg	BB
Bremen	HB
Hamburg	HH
Hessen	HE
Mecklenburg-Vorpommern	MV
Niedersachsen	NI
Nordrhein-Westfalen	NRW
Rheinland-Pfalz	RP
Saarland	SL
Sachsen	SN
Sachsen-Anhalt	ST
Schleswig-Holstein	SH
hüringen	TH

Vorgelegte Impfausweise bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014



Vorgelegte Impfausweise in Deutschland: 649.207



Definitionen für begonnene bzw. abgeschlossene Impfserien


- Da für die Grundimmunisierung der Kinder überwiegend Kombinationsimpfstoffe verwendet werden, werden für **Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Poliomyelitis und Hepatitis B** jeweils vier Impfungen als abgeschlossene Grundimmunisierung definiert bzw. für **Hib, Poliomyelitis und Hepatitis B** drei Impfungen bei Verwendung monovalenter Impfstoffe.
- **Masern-, Mumps-, Röteln- und Varizellenimpfungen** werden differenziert nach mindestens einer Impfung und zwei Impfungen erfasst.
- Die **Pneumokokkenimpfung** ist von der STIKO nur bis zum Ende des zweiten Lebensjahrs empfohlen. Für eine vollständige Pneumokokken-Impfserie sind in Abhängigkeit vom Alter bei Erstimpfung eine bis vier Impfungen notwendig (Alter bei Erstimpfung 2-6 Monate: mindestens 4 Impfungen; 7-11 Monate: mindestens 3 Impfungen; 12-23 Monate: mindestens 2 Impfungen; 24 Monate und älter: mindestens eine Impfung); alternativ wird die Gabe von mindestens zwei Impfstoffdosen ohne Berücksichtigung des Alters als vollständige Impfserie gewertet.
- Bei der Impfung gegen **Meningokokken C** ist eine Impfung ausreichend.
- Die **Rotavirusimpfung** ist mit zwei (bei Verwendung des Impfstoffs Rotarix®) bzw. drei Impfungen (Impfstoff RotaTeq®) vollständig ist und wird alternativ als „mindestens 2 Impfungen“ erfasst.
- Für die Impfung gegen **Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)** werden drei Impfungen als vollständige Impfserie erachtet.




Anmerkungen

- Die Impfquote der Poliomyelitis-, Hib- und Hepatitis-B-Impfung bezieht sich auf die Gabe von mindestens vier Dosen (Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein).
- Die Impfquote der Pneumokokken-Impfung bezieht sich auf die Gabe von mindestens zwei Dosen (Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen).
- Für Baden-Württemberg wurden Daten 4- bis 5-jähriger Kinder verwendet, die im Schuljahr 2013/2014 untersucht wurden und nach Stichtagsregelung 2015 eingeschult werden sollten.
- In Berlin basieren seit den Schuleingangsuntersuchungen 2013 die Daten auf den erstmalig untersuchten Kindern, zuvor auf den im entsprechenden Jahr eingeschulerten Kindern (d.h. einschließlich der im Vorjahr zurückgestellten Kinder).
- Für Sachsen wurden bei der 2. Masern-, Mumps-, Röteln-, Varzellennimpfung Daten aus den 2. Klassen verwendet; der Anteil von Kindern mit vorgelegtem Impfausweis betrug hier 82,7%.
- Für Sachsen-Anhalt wurden Daten 4- bis 5-jähriger Kinder verwendet, die 2014 untersucht, jedoch erst 2015 eingeschult wurden.


Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Diphtherie




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Tetanus




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Pertussis




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Hib



Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Poliomyelitis




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Hepatitis B




MMR-Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014


Deutschland gesamt, Alte Bundesländer, Neue Bundesländer




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 1. Masern




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 2. Masern




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 1. Mumps




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 2. Mumps




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 1. Röteln




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 2. Röteln




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 1. Varizellen




Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – 2. Varizellen



Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Meningokokken C



Impfquote bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 – Pneumokokken



Weitere Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014

- Die Impfung gegen **FSME** wird von der STIKO für alle in einem FSME-Risikogebiet gegenüber Zecken exponierten Personen empfohlen. Fünf Bundesländer mit FSME-Risikogebieten dokumentieren bei den Schuleingangsuntersuchungen auch die FSME-Impfquoten:

Baden-Württemberg 21,6 %

Bayern 33,8 %

Hessen 19,6 %

Saarland 8,6 %

Thüringen 21,2%

- Fünf Bundesländer dokumentierten bei den Schuleingangsuntersuchungen bisher die **Rotavirus**-Impfquoten:

vollst. Immunisierung: Baden-Württemberg 10,1 %

Brandenburg 15,3 %

Sachsen 23,0 %

mind. 2 Impfstoffdosen: Saarland 2,7 %

Thüringen 16,3 %