

CALENDRIER DE VACCINATION

Les vaccinations devraient se faire le plus tôt possible.
Une vérification du statut vaccinal est judicieuse à tout âge.
Il est recommandé de compléter immédiatement les vaccinations manquantes, conformément aux recommandations pour l'âge respectif.

Recommandations formulées par
l'équivalent allemand du Comité technique
des vaccinations (le STIKO), 2017/18.
www.stiko.de



Sprache: **Französisch**

VACCINATION	ÂGE	Nourrissons		Enfants en bas âge		Enfants			Adolescents		Adultes							
		(en semaines)	(en mois)		(en années)													
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	≥ 18	≥ 60				
			U4		U6		U7			U7A/8		U9		U10		J1		
Tétanos		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2		A (tous les 10 ans, f)		N si nécessaire			
Diphtérie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2		A (tous les 10 ans, f)		N si nécessaire			
Coqueluche		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2		A (f)		N si nécessaire			
Poliomyélite		G1	G2 a	G3	G4	N					A1		N (si nécessaire)					
Hépatite B		G1	G2 a	G3	G4	N												
Hib <i>Haemophilus influenzae type b</i>		G1	G2 a	G3	G4	N												
Pneumocoques ⓑ		G1		G2	G3	N							S c					
Rotavirus		G1 b	G2	(G3)														
Méningocoques Sérogroupe C				G1 (dès l'âge de 12 mois)		N												
Rougeole				G1	G2	N						S d						
Oreillons-Rubéole				G1	G2	N												
Varicelle				G1	G2	N												
Grippe Influenza													S (tous les ans)					
HPV Papillomavirus humains							G1 e		G2 e	N e								

Prochain rendez-vous de vaccination



Gefördert durch:
 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

EXPLICATIONS

- G** IMMUNISATION DE BASE (administrée sous forme de 4 vaccinations partielles G1-G4)
- S** VACCINATION STANDARD
- A** VACCINATION DE RAPPEL
- N** VACCINATION DE RATTRAPAGE (Immunsation de base de toutes les personnes non encore vaccinées ou terminer une série de vaccinations incomplète)
- U** Test d'identification précoce
- J** Examen de jeunes (J1 âgés de 12 à 14 ans)
- a** Si un vaccin monovalent est administré, cette dose peut être supprimée.
- b** La 1ère vaccination devrait se faire dès l'âge de six semaines; en fonction du vaccin utilisé, 2 ou 3 doses seront nécessaires à intervalle d'au moins 4 semaines.
- c** Vaccination avec un vaccin polysaccharidique. Le vaccin de rappel n'est recommandé qu'avec certaines indications.
- d** Vaccination unique pour toutes les personnes nées après 1970, âgées de 18 ans ou plus, ayant un statut vaccinal incertain ou inconnu, sans vaccination ou avec une seule vaccination pendant l'enfance. De préférence avec un vaccin ROR.
- e** Vaccination standard pour des filles âgées de 9 à 14 ans. Vaccins de rappel et nombre de doses de vaccin: voir l'information scientifique.
- f** Vaccination de rappel DT tous les 10 ans. La prochaine vaccination DT soit sous forme de vaccination unique DTaP, soit sous forme de vaccination combinée tétravalente DTaP-IPV, si indication correspondante.
- g** Les prématurés reçoivent une dose supplémentaire de vaccin à l'âge de trois mois, soit 4 doses au total.