



Sprache: **Kroatisch**

DOB \ CJEPIVO	Dojenčad (u tjednima)		Mala djeca (po mjesecima)				Veća djeca (po godinama)			Mladež		Odrasli		
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	od 18	od 60	
			U4			U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (svakih 10 godina, f) N po potrebi				
Difterija		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (svakih 10 godina, f) N po potrebi				
Hripavac Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (f) (N po potrebi)				
Dječja paraliza Poliomyelitis		G1	G2 ^a	G3	G4	N			A1	N (po potrebi)				
Hepatitis B		G1	G2 ^a	G3	G4	N								
Hib Haemophilus influenzae tip b		G1	G2 ^a	G3	G4	N								
Pneumokokna infekcija ^g		G1		G2	G3	N					S ^c			
Rotavirusi	G1 ^b	G2	(G3)											
Meningokokna infekcija Serološka grupa C					G1 (od 12 mjeseci)		N							
Ospice					G1	G2	N				S ^d			
Zaušnjaci Crvenka					G1	G2	N							
Vodne kozice Varicella					G1	G2	N							
Gripa Influenza									S (godišnje)					
HPV Čovječji papilloma virus							G1 ^e	G2 ^e	N ^e					

Datumi narednih cijepljenja



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

OBRAZLOŽENJA

G BAZNA IMUNIZACIJA (do 4 doze G1–G4 cjepiva)

S STANDARDNO CIJEPLJENJE

A PONOVRNO CIJEPLJENJE – BUSTER DOZA

N NADOKNADA CIJEPLJENJA (bazna imunizacija svih koji dosad nisu bili cijepljeni ili dopuna necjelovite serije cijepljenja)

U Pregled za rano otkrivanje

J Pregled mladeži (J1 u dobi od 12–14 godina)

^a Ova doza nije potrebna prilikom uporabe monovalentnog cjepiva.

^b Prvo cijepljenje trebalo bi uslijediti već od 6. tjedna života, a ovisno o korištenom cjepivo potrebne su 2 odnosno 3 doze u razmaku od najmanje 4 tjedana.

^c Cijepljenje polisaharidnim cjepivom, docjepljivanje se preporuča samo kod određenih indikacija.

^d Jednokratno cijepljenje svih punoljetnih osoba koje su rođene nakon 1970. godine, koje nisu nijednom ili su samo jednom cijepljene u djetinjstvu ili za koje se ne zna točno stanje procijepljenosti. Preferira se MMR cjepivo.

^e Standardno cjepivo za djevojčice u dobi od 9 do 14 godina.

Za naknadne vakcinacije i ukupan broj doza za vakcinaciju pogledajte stručne informacije!

^f Td docjepljivanje svakih 10 godina. Sljedeće potrebno Td cijepljenje jednokratno kao Tdap ili u slučaju odgovarajuće indikacije kombiniranim cjepivom Tdap-IPV.

^g Nedonoščad prima jednu dodatnu dozu cjepiva u dobi od tri mjeseca, dakle ukupno 4 doze.