

KALENDAR CIJEPLJENJA

Sprache: Kroatisch

Cijepljenja bi trebalo obaviti u najranijem mogućem trenutku.

Provjeravanje cjepnog statusa ima smisla životnoj dobi. Ona cijepljenja koja nedostaju trebalo bi odmah nadoknaditi, sukladno preporukama za svaku životnu dob.

Preporuke Stalne komisije za cijepljenja
(STIKO), 2024. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



CIJEPLJENJE DOB

in tjednima	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	od 18	od 60
					U4	U5	U6			U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2			

rotavirusi	G1 ^a			G2			(G3)														
	G1	N	G2	N	G3 ^c	N						A1	N	A2	N	A ^f					
Ttetanus ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N						A1	N	A2	N	A ^f					
difterija ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N						A1	N	A2	N	A ^f					
pertusis ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N						A1	N	A2	N	A3 ^f	N				
haemophilus influenzae typa b ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N															
poliomijelitis ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N								A1							
hepatitis b ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N															
pneumokoki ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N										S ^h					
meningokok B ^d	G1	N	G2	N	G3 ^d	N															
ospice					G1	N	G2							N		S ^g					
zaušnjaci, rubeola					G1	N	G2							N							
varičele					G1	N	G2							N							
meningokoki C					G1	N															
humani papiloma virus												G1 G2 ^e		N							
COVID 19															G ⁱ	S ⁱ					
herpes zoster															G1 G2 ^j						
influenca															S ^j	(godišnje)					

Sljedeći termini
za cijepljenja



POJAŠNJENJA

G TEMELJNA IMUNIZACIJA
(cijepljenje u do 3 dijela G1 – G3)

S STANDARDNO CIJEPLJENJE

A DOCJEPLJIVANJE

N NADOKNADNO CIJEPLJENJE
(Temeljna imunizacija svih onih, koji još nisu cijepljeni odnosno kompletiranje nepotpune serije cijepljenja)

U Pregled radi ranog otkrivanja

J Pregled mladih
(J1 u dobi od 12–14 godina)

a Prva doza cjepliva već od starosne dobi od 6 tjedana, ovisno o cjeplivu koje se upotrebljava, 2 odnosno 3 doze cjepliva u razmaku od najmanje 4 tjedna.

b Prijevremeno rođena djeca: dodatna doza cjepliva u dobi od 3 mjeseca, to znači ukupno 4 doze cjepliva.

c Najmanji razmak od prethodne doze: 6 mjeseci.

d 3 doze u dobi od 2 do 23 mjeseca; od dobi od 24 mjeseca, serija cjepliva sastoji se od 2 doze.

e Dvije doze cjepliva u razmaku od najmanje 5 mjeseci, kod nadoknadnih cijepljenja počevši u dobi ≥ 15 godina ili kod razmaka između cijepljenja < 5 mjeseci, između 1. i 2. doze potrebna je 3. doza.

f Td-docjepljivanje svakih 10 godina. Slijedeće potrebno Td-cijepljenje jednokratno u obliku Tdap- odnosno u slučaju odgovarajućih indikacija u obliku Tdap-IPV-kombiniranog cjepliva.

g Jednokratno cijepljenje s MMR-cjeplivom za sve osobe rođene nakon 1970. godine ≥ 18 godina s nejasnim cjepljivim statusom, bez cijepljenja ili sa samo jednim cijepljenjem u djetinjstvu.

h Preporučeno uz PCV20

i Za zaštitu osoba bez osnovne bolesti potrebna su (najmanje) 3 kontakta s antigenima, od kojih najmanje jedan mora biti cjeplivo.

j Ponovite pojačano cijepljenje s minimalnim intervalom od 12 mjeseci od posljednjeg izlaganja antigenu, po mogućnosti u jesen

antigenu, po mogućnosti u jesen

* Cijepljenja mogu biti podijeljena u nekoliko termina cijepljenja. MMR i V se mogu dati u istom terminu ili u razmaku od 4 tjedna.