

Petrome divê di dema herî lez a pêkan da pêk bêñ.

Hilkolandina dubare ya rewşa Petromekirinê di her temenekî da sûdmend û beraqil e.
Petromekirinê pêknehatî divê bilez li gorî tewsiye û tamiyên têkildarî temen, piştra pêk bêñ.

**Tamî û tewsiyeyê Komîsiyona Hertimî
ya Petromekirinê (STIKO), 2024. www.stiko.de**



**Li gorî
hefteye**

Li gorî mehê

Li gorî salê

6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	≥ 18	≥ 60
	U4			U5		U6			U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		

**Demêñ din ên
petromekirinê**



Rotavîrûs

	G1 ^a	G2	(G3)														
Tetanus ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c		N		A1	N	A2	N	A	f			
Diftêrî ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c		N		A1	N	A2	N	A	f			
Pertussis ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c		N		A1	N	A2	N	A3	f	N		
Hêmofîlîs (Haemophilus) Flûya ^b cûreya ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c		N										
Poliomyelitis ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c		N						A1		N		
Hêpatîta B ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c												
Pênumokok ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c		N							S ^h			
Menîngokok B ⁱ	G1	N	G2	N		G3 ^d	N										
Sorik					G1	N	G2						N		S ^g		
Mumps, rubella					G1	N	G2						N				
Varicella					G1	N	G2						N				
Mênjonokên C					G1								N				
Vîrusên Papîlomaya Mirovî										G1 G2 ^e			N				
Kovîd-19													G ⁱ	S ⁱ			
Herpes zoster													G1 G2 ^j				
Influenza													S ^j (salane)				

^a Vaksinimi i parê duhet bêrê qê nê moshën 6 javêshe dhe nê varêsi tê vaksinës sê pêrdorur nevojiten 2 ose 3 doza vaksine nê distancê kohore tê paktén 4 javê.

^b Fémijêt e lindur para kohe: marrin dozê shtesê vaksinê nê moshën 3 muajsh, d.m.th. gjithsej 4 doza.

^c Distanca kohore minimale nga doza e mëparshme: 6 muaj.

^d Di temenê 2 heta 23 mehan de 3 doz; Ji temenê 24 mehî ve, rézikên vaksîne yê ji 2 dozan pêk tê.

^e Dy doza vaksine nê distancê kohore tê paktén 5 muaj, te vaksinimi plotësesue duke filluar nga mosha ≥ 15 vîjeç ose te periudha e vaksinimit < 5 muajsh ndërmjet dozave 1 dhe 2 êştê e domosdoshme një dozê e 3-tê.

^f Vaksinim pêrforces Td çdo 10 vjet. Vaksinimi tjeter Td i planifikuar duhet administruar si dozê e vetme Tdap ose, nê rastin e indikacionit pêrkatê, si vaksinim i kombinuar Tdap-IPV.

^g Vaksinim me njé dozê tê vetme me vaksinê MMR pér tê gjithê personat e ≥ 18 vîjeç tê lindur pas vitit 1970 dhe me status vaksinimi tê paqartê, tê pavaksinuar ose vetêm me njé vaksinim nê fémijéri.

^h Bi PCV20 re tê pêşneyîar kirin

ⁱ Ji bo parastina kesên bêyî nexweşîya paşxanî, (herikêm) 3 vegirtinên antijenan pêwîst e, ku herî kêm yek ji wan divê vaksîne be.

^j Vaksînelîdانا bîhêzkerâ berdewam bi navberên herî kêm 12 mehan ji tékilîya herî dawî ya antijenê,

bi tercihî di payizê de

* Vaksinimet mund tê ndahen nê disa data vaksinimi. MMR dhe V mund tê bêhen nê tê njëjtên datê ose nê distancê kohore prej 4 javêsh.

ŞIROVE

G EWLEHKIRINA BINGEH

(Di herîkêm 3 carêñ petromekirinê
da G1 – G3)

S PETROMEKIRINA STANDARD

A PETROMEKIRINA BIBÎRXISTINÊ

N PETROMEKIRINA CEBIRANDINÊ

(Ewlehkirina bingeh a hemî kesên
ku heta niha nehatine petromekirin
an Temamkirina réze petromekiri
neke nîvişkan)

U Lênihêrîna (muayenêya) pêder
xistina zûdem

J Lînêrîna xortan
(J1 di temenê 12-14 saletiyê da)