



Abbildung 1, Seite 8
Altersspezifische Erkrankungsraten am malignen Melanom der Haut, Saarland 1991–2000
Angaben pro 100.000 Einwohner
Quelle: Krebsregister Saarland

Alter in Jahren	Männer	Frauen
0–4	0	0
5–9	0	0
10–14	0,35	0
15–19	1,47	1,54
20–24	3,44	4,26
25–29	5,53	6,38
30–34	5,15	8,17
35–39	6,21	7,49
40–44	8,20	8,41
45–49	12,33	12,29
50–54	10,66	13,44
55–59	16,77	15,01
60–64	19,93	14,15
65–69	27,38	15,19
70–74	25,08	17,83
75–79	25,66	13,10
80–84	28,54	24,68
≥85	30,92	13,35

Abbildung 2, Seite 8
Alterstandardisierte Erkrankungsraten und Mortalität am malignen Melanom der Haut, Saarland 1970–2000, gleitende Mittelwerte
Angaben pro 100.000 Einwohner
Quelle: Krebsregister Saarland

Jahre	Inzidenz Männer	Inzidenz Frauen	Mortalität Männer	Mortalität Frauen
1970–1972	3,11	2,99	0,75	0,86
1971–1973	3,33	2,92	0,98	0,80
1972–1974	3,16	2,82	1,90	1,22
1973–1975	2,13	2,77	2,01	1,26
1974–1976	1,88	2,98	2,17	1,70
1975–1977	2,18	3,31	1,73	1,73
1976–1978	3,81	3,88	1,91	1,84
1977–1979	4,63	4,94	1,94	1,56
1978–1980	4,55	5,46	1,74	1,34
1979–1981	4,39	6,40	1,52	1,23
1980–1982	5,18	6,33	1,47	1,39
1981–1983	5,66	6,09	1,76	1,19
1982–1984	6,23	6,07	1,63	1,33
1983–1985	6,02	7,32	2,03	1,20
1984–1986	7,20	7,58	2,32	1,54
1985–1987	7,99	7,63	2,45	1,67
1986–1988	8,16	6,73	2,50	1,77
1987–1989	8,84	8,96	2,26	2,05
1988–1990	8,37	9,01	2,83	2,08
1989–1991	8,26	8,79	2,81	2,03
1990–1992	7,49	7,94	2,75	1,80
1991–1993	8,01	7,98	2,64	1,73
1992–1994	8,59	8,08	2,48	1,65
1993–1995	8,96	7,55	2,57	1,39
1994–1996	8,72	7,66	2,44	1,02
1995–1997	8,14	8,10	2,40	1,16
1996–1998	8,49	7,79	2,41	1,43
1997–1999	8,84	7,23	2,04	1,65
1998–2000	9,86	7,45	1,93	1,86



Abbildung 3, Seite 10
Europäischer Vergleich der Inzidenz und Mortalität am malignen Melanom bei Männern 1998 (Europastandard)
Fälle pro 100.000 Einwohner
Quelle: EUCAN [6]

Land	Inzidenz	Mortalität
Schweden	16,08	4,07
Dänemark	13,91	3,75
Finnland	12,27	3,31
Österreich	11,85	3,35
Niederlande	11,61	3,38
Irland	9,78	1,46
England	8,91	2,53
Frankreich	8,29	2,13
Deutschland	8,21	2,33
Italien	8,13	2,35
Luxemburg	7,96	3,20
Belgien	6,45	1,51
Spanien	5,85	1,92
Portugal	4,74	1,39
Griechenland	2,76	0,81

Abbildung 4, Seite 11
Europäischer Vergleich der Inzidenz und Mortalität am malignen Melanom bei Frauen 1998 (Europastandard)
Fälle pro 100.000 Einwohner
Quelle: EUCAN [6]

Land	Inzidenz	Mortalität
Irland	16,12	2,39
Schweden	15,00	2,22
Dänemark	14,46	2,21
Niederlande	14,32	2,21
Österreich	13,52	2,19
Luxemburg	12,82	2,17
Frankreich	10,87	1,50
England	10,78	2,12
Finnland	9,14	1,77
Deutschland	8,82	1,58
Belgien	8,53	1,49
Spanien	7,50	1,22
Italien	6,96	1,44
Portugal	6,52	1,05
Griechenland	3,88	0,83

Abbildung 5, Seite 12
Weltweiter Vergleich der Inzidenz und Mortalität am malignen Melanom bei Männern im Jahr 2000 (Weltstandard)
Fälle pro 100.000 Einwohner
Quelle: GLOBOCAN [7]

Region	Inzidenz	Mortalität
Australien/Neu Seeland	39,88	4,88
Nordamerika	12,74	2,67
Nordeuropa	7,37	2,11
Westeuropa	7,01	1,76
südliches Afrika	6,04	2,92
Polynesien	5,75	2,90
Osteuropa	5,22	1,67
Melanesien	5,07	2,11
Südeuropa	3,78	1,45
Mikronesien	3,17	1,50
Südamerika	3,06	0,94
Zentralafrika	2,98	1,49
Zentralamerika	2,05	0,64
Ostafrika	1,79	0,94
Westasien	1,27	0,53
Westafrika	1,23	0,60
Nordafrika	0,94	0,52
Karibik	0,88	0,33
Südost-Asien	0,44	0,21
Süd-/Zentralasien	0,40	0,19
Ost-Asien	0,25	0,13

Abbildung 6, Seite 13
Weltweiter Vergleich der Inzidenz und Mortalität am malignen Melanom bei Frauen im Jahr 2000 (Weltstandard)
Fälle pro 100.000 Einwohner
Quelle: GLOBOCAN [7]

Region	Inzidenz	Mortalität
Australien/Neu Seeland	32,32	2,62
Nordamerika	9,26	1,38
Nordeuropa	8,73	1,56
Westeuropa	8,13	1,33
Osteuropa	5,01	1,09
Südeuropa	4,64	1,06
südliches Afrika	4,58	2,23
Ostafrika	3,26	1,55
Melanesien	3,11	0,98
Zentralafrika	2,32	1,21
Polynesien	2,09	0,00
Südamerika	1,96	0,60
Mikronesien	1,61	0,88
Zentralamerika	1,57	0,49
Westafrika	1,28	0,63
Westasien	1,21	0,45
Karibik	0,73	0,25
Nordafrika	0,70	0,40
Südost-Asien	0,52	0,24
Süd-/Zentralasien	0,37	0,19
Ost-Asien	0,18	0,10

Themenheft 22 – Hautkrebs

Ergänzende Wertetabellen zu den Abbildungen
Stand: 2004



Abbildung 7, Seite 16

Inzidenzen des Basalzellkarzinoms nach Alter im Saarland 1995–1997 (rohe Raten)

Fälle pro 100.000 Einwohner

Quelle: Krebsregister Saarland

Altersgruppe	Männer	Frauen
0–4	0	0
5–9	0	0
10–14	0	0
15–19	0	0
20–24	0	2,4
25–29	6,1	1,7
30–34	3,5	11,7
35–39	10,8	13,8
40–44	21,7	27,8
45–49	52,4	50,8
50–54	73,1	60,2
55–59	102,4	87,1
60–64	170,4	118,0
65–69	250,4	137,3
70–74	336,7	168,3
75–79	406,2	268,9
80–84	418,7	287,1
≥85	421,7	256,7

Abbildung 9, Seite 17

Inzidenz des Plattenepithelkarzinoms nach Alter im Saarland 1970–1997 (rohe Raten)

Fälle pro 100.000 Einwohner

Quelle: Krebsregister Saarland

Altersgruppe	Männer	Frauen
0–4	0	0
5–9	0	0
10–14	0	0
15–19	0	0
20–24	0	0
25–29	0	0,8
30–34	0,7	0,7
35–39	2,2	0
40–44	4,0	1,7
45–49	3,8	0,9
50–54	7,6	4,4
55–59	16,7	6,5
60–64	27,7	14,6
65–69	49,6	10,4
70–74	104,5	36,5
75–79	157,0	61,2
80–84	210,3	111,3
≥85	194,9	162,6

Abbildung 8, Seite 16

Trends der Inzidenz des Basalzellkarzinoms im Saarland 1970–1997 (Europastandard)

Fälle pro 100.000 Einwohner, altersstandardisiert

Quelle: Krebsregister Saarland

Jahr	Männer	Frauen
1970–1972	5,8	4,0
1971–1973	5,9	3,9
1972–1974	7,7	5,7
1973–1975	12,0	8,6
1974–1976	16,3	10,4
1975–1977	18,4	11,5
1976–1978	17,8	11,7
1977–1979	17,7	14,2
1978–1980	20,6	16,1
1979–1981	24,4	18,6
1980–1982	27,5	20,1
1981–1983	32,6	22,1
1982–1984	38,6	23,7
1983–1985	45,0	27,5
1984–1986	50,4	30,7
1985–1987	50,8	33,7
1986–1988	51,7	34,6
1987–1989	58,2	38,5
1988–1990	66,6	42,2
1989–1991	69,9	44,1
1990–1992	68,2	45,5
1991–1993	66,2	45,4
1992–1994	70,0	47,8
1993–1995	67,5	46,2
1994–1996	67,3	45,5
1995–1997	63,0	44,3

Themenheft 22 – Hautkrebs

Ergänzende Wertetabellen zu den Abbildungen

Stand: 2004



Abbildung 10, Seite 17

Trends der Inzidenz des Plattenepithelkarzinoms im Saarland 1970–1997 (Europastandard)

Fälle pro 100.000 Einwohner, altersstandardisiert

Quelle: Krebsregister Saarland

Jahre	Männer	Frauen
1970–1972	3,7	2,8
1971–1973	5,0	3,1
1972–1974	6,4	3,9
1973–1975	6,7	4,2
1974–1976	7,4	3,7
1975–1977	7,4	3,5
1976–1978	7,6	3,4
1977–1979	7,6	3,1
1978–1980	7,9	3,1
1979–1981	9,7	3,3
1980–1982	9,4	3,6
1981–1983	9,8	3,6
1982–1984	9,0	3,9
1983–1985	9,7	4,7
1984–1986	12,1	5,2
1985–1987	13,2	5,6
1986–1988	15,3	5,4
1987–1989	15,5	5,4
1988–1990	16,3	5,8
1989–1991	15,9	6,3
1990–1992	16,6	6,8
1991–1993	18,0	6,9
1992–1994	17,9	7,5
1993–1995	17,0	7,2
1994–1996	15,9	7,7
1995–1997	16,0	7,2

Abbildung 11, Seite 18

Trends der Mortalität bei nicht-melanozytären Hautkrebsen in den alten Bundesländern 1970–1997; ab 1990 Deutschland (Europastandard)

Fälle pro 100.000 Einwohner, altersstandardisiert

Quelle: Krebsregister Saarland

Jahre	Männer	Frauen	Männer Deutschland	Frauen Deutschland
1970–1972	0,79	0,60		
1971–1973	0,80	0,59		
1972–1974	0,84	0,57		
1973–1975	0,82	0,59		
1974–1976	0,79	0,55		
1975–1977	0,77	0,53		
1976–1978	0,70	0,46		
1977–1979	0,69	0,42		
1978–1980	0,60	0,38		
1979–1981	0,59	0,34		
1980–1982	0,56	0,37		
1981–1983	0,57	0,37		
1982–1984	0,59	0,37		
1983–1985	0,59	0,34		
1984–1986	0,60	0,34		
1985–1987	0,61	0,33		
1986–1988	0,58	0,32		
1987–1989	0,56	0,31		
1988–1990	0,52	0,29		
1989–1991	0,53	0,29		
1990–1992	0,53	0,28	0,64	0,32
1991–1993	0,55	0,29	0,66	0,33
1992–1994	0,54	0,26	0,64	0,31
1993–1995	0,53	0,24	0,60	0,29
1994–1996	0,49	0,24	0,56	0,28
1995–1997	0,46	0,24	0,52	0,27
1996–1998			0,49	0,25
1997–1999			0,46	0,23
1998–2000			0,47	0,24

Themenheft 22 – Hautkrebs

Ergänzende Wertetabellen zu den Abbildungen

Stand: 2004



Abbildung 12, Seite 27

Arbeitsunfähigkeitsfälle am malignen Melanom je 10.000
Pflichtversicherte (ICD-9 172; ICD-10 C43)

Quelle: AOK Krankheitsartenstatistik

Jahr	AOK West	AOK West	AOK Ost	AOK Ost	AOK DEU	AOK DEU
	ICD 172	ICD 172	ICD 172	ICD 172	ICD C43	ICD C43
	Fälle Frauen	Fälle Männer	Fälle Frauen	Fälle Männer	Frauen	Männer
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
	Versicherte	Versicherte	Versicherte	Versicherte		
1991	2,19	1,66	1,00	0,79		
1992	2,43	1,71	1,54	1,56		
1993	2,33	1,66	1,75	1,84		
1994	2,34	1,9	2,01	2,13		
1995	2,58	2,06	2,12	1,92		
1996	2,55	2,32	3,25	2,59		
1997	2,31	2,04	3,04	2,43		
1998	2,26	2,2	2,69	2,46		
1999	2,39	2,15	2,33	2,54		
2000					2,82	2,51
2001					2,86	2,44

Abbildung 13, Seite 27

Arbeitsunfähigkeitsfälle an nichtmelanozytären Hautkrebsen
je 10.000 Pflichtversicherte (ICD-9 173; ICD-10 C44)

Quelle: AOK Krankheitsartenstatistik

Jahr	AOK West	AOK West	AOK Ost	AOK Ost	AOK DEU	AOK DEU
	ICD 173	ICD 173	ICD 173	ICD 173	ICD C44	ICD C44
	Fälle Frauen	Fälle Männer	Fälle Frauen	Fälle Männer	Frauen	Männer
	je 10.000	je 10.000	je 10.000	je 10.000		
	Versicherte	Versicherte	Versicherte	Versicherte		
1991	1,59	2,26	1,40	1,75		
1992	1,77	2,46	1,50	1,88		
1993	1,71	2,35	1,52	2,05		
1994	2,05	2,74	1,99	2,36		
1995	1,93	2,52	2,03	2,31		
1996	1,81	2,51	2,10	2,27		
1997	2,02	2,40	1,95	2,40		
1998	1,96	2,72	1,62	2,27		
1999	2,12	2,59	2,00	2,78		
2000					2,73	3,60
2001					3,18	3,82