

Themenheft 51 – Depressive Erkrankungen

Ergänzende Wertetabellen zu den Abbildungen

Stand: September 2010



Abbildung 6, Seite 18

Kumuliertes Risiko einer sekundären depressiven Störung bei Fällen mit einer Angststörung in der Vorgeschichte

Anteil in Prozent

Quelle: EDSP 2001

Ersterkrankungs- alter in Jahren	Generalisierte Angststörung	Agoraphobie	Panikstörung	Soziale Phobie	Spezifische Phobie	keine Angststörung
10	0,00	8,64	0,00	10,13	2,64	0,30
11	7,15	9,52	0,00	10,28	3,51	0,40
12	10,50	10,69	0,00	10,55	4,83	0,40
13	14,28	15,37	0,00	11,72	6,88	0,50
14	14,43	15,67	11,24	13,02	8,56	1,40
15	37,53	21,76	20,27	17,11	12,09	2,30
16	39,83	29,81	20,66	18,79	15,16	3,50
17	48,15	35,53	26,48	23,11	18,84	4,60
18	50,46	39,54	40,05	24,40	20,68	5,20
19	51,22	39,01	40,44	28,20	22,51	6,20
20	51,33	39,54	39,95	33,56	25,15	7,40
21	52,41	43,37	45,14	35,68	27,11	7,90
22	53,43	43,85	45,44	35,89	28,79	8,40
23	53,47	43,94	45,87	38,82	31,49	9,60
24	54,07	47,53	46,48	42,59	34,20	10,30
25	55,72	49,39	49,97	44,87	35,00	10,60
26	55,72	49,39	49,97	45,65	35,77	11,40
27	55,72	50,58	49,97	46,44	36,44	12,20
28	55,72	50,58	49,97	46,44	36,44	12,90
29	55,72	50,58	49,97	46,44	36,44	13,50

Abbildung 7

Anteil der jemals ärztlich oder therapeutisch festgestellten Depression in der ab 18-jährigen Bevölkerung

Anteil in Prozent

Quelle: GEDA09

Alter in Jahren	Frauen	Männer
18–29	10,1	5,2
30–39	16,3	6,7
40–49	18,2	10,6
50–59	21,7	15,2
60–69	19,7	10,9
70+	13,1	5,6