



Abbildung 1, Seite 9

Ein-Jahres-Prävalenzen psychischer Störungen bei Erwachsenen von 18 bis 65 Jahren (eigene Analysen anhand des Zusatzmoduls »Psychische Störungen« des Bundes-Gesundheitssurveys 1998, [9])

Aufgeführt sind die vier häufigsten Diagnosegruppen gemäß ICD-10 (Mehrfachnennungen)

Diagnose	Männer	Frauen	Gesamt
Irgendeine psychische Störung (Fo-99)	25,3 %	37,0 %	31,1 %
Angststörungen (F40-42)	9,2 %	19,8 %	14,5 %
Störungen durch psychotrope Substanzen (F1)	15,7 %	10,6 %	13,2 %
Affektive Störungen (F3)	8,5 %	15,4 %	11,9 %
Somatoforme Störungen (F45)	7,1 %	15,0 %	11,0 %

Abbildung 2, Seite 12

Struktur der Psychotherapie-Berechtigungen nach den Richtlinienverfahren zum 31.12.2004 [20]

	Verhaltens- therapie	Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie	Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und analytische Psychotherapie	Analytische Psychotherapie
Psychologische Psychotherapeuten	6.071	4.088	1.734	496
Ärztliche Psychotherapeuten (ausschließlich psychotherapeutisch tätig)	560	2.166	896	112
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten	608	735	963	228

Abbildung 3, Seite 13

An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten nach Bundesländern bezogen auf 100.000 Einwohner ab 18 Jahren (Stichtag: 31.12.2004) [22]

Quelle: Struktur der Arztstatistik [20]

	Psychologische Psycho- therapeuten je 100.000 Einwohner ab 18 Jahre
Deutschland	18,3
Baden-Württemberg	16,0
Bayern	17,3
Berlin	49,5
Brandenburg	6,5
Bremen	45,4
Hamburg	41,3
Hessen	26,8
Mecklenburg-Vorpommern	6,5
Niedersachsen	15,1
Nordrhein-Westfalen	19,5
Rheinland-Pfalz	13,3
Saarland	17,1
Sachsen	8,7
Sachsen-Anhalt	5,8
Schleswig-Holstein	15,2
Thüringen	9,3

Abbildung 4, Seite 14

An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende ärztliche Psychotherapeutinnen und -therapeuten nach Bundesländern bezogen auf die Gesamtbevölkerung (Stichtag: 31.12.2004) [22]

Quelle: Struktur der Arztstatistik [20]

	Ärztliche Psychotherapeuten je 100.000 Einwohner
Deutschland	4,5
Baden-Württemberg	7,0
Bayern	7,2
Berlin	5,3
Brandenburg	1,0
Bremen	5,4
Hamburg	6,7
Hessen	8,5
Mecklenburg-Vorpommern	1,3
Niedersachsen	3,3
Nordrhein-Westfalen	3,2
Rheinland-Pfalz	3,5
Saarland	3,7
Sachsen	1,0
Sachsen-Anhalt	0,4
Schleswig-Holstein	3,7
Thüringen	0,8

Themenheft 41 – Psychotherapeutische Versorgung

Ergänzende Wertetabellen zu den Abbildungen

Stand: 2008



Abbildung 5, Seite 14

An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten nach Bundesländern bezogen auf 100.000 Einwohner unter 18 Jahren

(Stichtag: 31.12.2004) [22]

Quelle: Struktur der Ärztestatistik [20]

	Kinder und Jugendpsychotherapeuten je 100.000 Einwohner unter 18 Jahre
Deutschland	17,1
Baden-Württemberg	26,9
Bayern	17,2
Berlin	32,7
Brandenburg	6,1
Bremen	41,7
Hamburg	23,6
Hessen	23,2
Mecklenburg-Vorpommern	3,8
Niedersachsen	20,2
Nordrhein-Westfalen	28,7
Rheinland-Pfalz	10,5
Saarland	11,1
Sachsen	8,9
Sachsen-Anhalt	0,6
Schleswig-Holstein	10,7
Thüringen	5,2

Abbildung 6, Seite 21

Betten je 100.000 Einwohner (erwachsene Durchschnittsbevölkerung ab 18 Jahre in 2004) in Fachabteilungen für Psychotherapeutische Medizin in der Krankenhausbehandlung nach Bundesländern [46]

	Psychotherap. Medizin – Betten je 100.000 Einwohner ab 18 Jahre
Deutschland	6,5
Baden-Württemberg	8,8
Bayern	17,3
Berlin	5,7
Brandenburg	–
Bremen	3,2
Hamburg	4,9
Hessen	1,5
Mecklenburg-Vorpommern	4,1
Niedersachsen	3,4
Nordrhein-Westfalen	2,8
Rheinland-Pfalz	1,6
Saarland	–
Sachsen	4,7
Sachsen-Anhalt	8,3
Schleswig-Holstein	19,7
Thüringen	1,7

Abbildung 7, Seite 22

Diagnoseverteilung von insgesamt 39.170 Frauen und 30.108 Männern mit psychischen Störungen (ICD-10-Erstdiagnosen Fo–F6) in Fachabteilungen für Psychotherapeutische Medizin im Jahr 2004 [48]

Diagnose	Männer	Frauen	Gesamt
Persönlichkeitsstörungen (F6)	4,4 %	7,0 %	5,9 %
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F5)	1,1 %	8,1 %	5,0 %
Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4)	20,5 %	24,0 %	22,4 %
Affektive Störungen (F3)	28,2 %	38,8 %	34,2 %
Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen (F2)	15,7 %	10,6 %	12,8 %
Störungen durch psychotrope Substanzen (F1)	25,2 %	6,6 %	14,6 %
Organische psychische Störungen (Fo)	4,9 %	5,0 %	5,0 %



Themenheft 41 – Psychotherapeutische Versorgung

Ergänzende Wertetabellen zu den Abbildungen
Stand: 2008

Abbildung 8, Seite 22

Betten je 100.000 Einwohner (erwachsene Durchschnittsbevölkerung ab 18 Jahre in 2004) in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie in der Krankenhausbehandlung nach Bundesländern [46]

Psychiatrie und Psychotherapie – Betten je 100.000 Einwohner ab 18 Jahre	
Deutschland	78,5
Baden-Württemberg	75,6
Bayern	68,7
Berlin	70,4
Brandenburg	72,2
Bremen	126,8
Hamburg	81,3
Hessen	76,9
Mecklenburg-Vorpommern	67,4
Niedersachsen	72,6
Nordrhein-Westfalen	97,9
Rheinland-Pfalz	71,5
Saarland	63,8
Sachsen	70,5
Sachsen-Anhalt	67,5
Schleswig-Holstein	83,4
Thüringen	70,4

Abbildung 10, Seite 24

Betten je 100.000 Einwohner (Durchschnittsbevölkerung unter 18 Jahre in 2004) in Fachabteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in der Krankenhausbehandlung nach Bundesländern [46]

Kinder- und Jugendpsychiatrie – Betten je 100.000 Einwohner unter 18 Jahre	
Deutschland	32,4
Baden-Württemberg	22,6
Bayern	16,9
Berlin	29,5
Brandenburg	52,6
Bremen	35,9
Hamburg	23,9
Hessen	34,3
Mecklenburg-Vorpommern	59,1
Niedersachsen	36,7
Nordrhein-Westfalen	30,2
Rheinland-Pfalz	22,1
Saarland	24,2
Sachsen	58,2
Sachsen-Anhalt	77,1
Schleswig-Holstein	44,2
Thüringen	70,7

Abbildung 9, Seite 23

Diagnoseverteilung von insgesamt 275.304 Frauen und 339.911 Männern mit psychischen Störungen (ICD-10-Erstdiagnosen Fo–F6) in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie im Jahr 2004 [48]

Diagnose	Männer	Frauen	Gesamt
Persönlichkeitsstörungen (F6)	3,1%	6,9%	4,8%
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F5)	0,3%	0,9%	0,5%
Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4)	8,6%	13,1%	10,6%
Affektive Störungen (F3)	14,2%	29,3%	21,0%
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F2)	18,7%	20,4%	19,5%
Störungen durch psychotrope Substanzen (F1)	48,9%	19,1%	35,6%
Organische psychische Störungen (Fo)	6,3%	10,2%	8,0%

Abbildung 11, Seite 23

Diagnoseverteilung von insgesamt 16.288 Mädchen und 18.388 Jungen mit psychischen Störungen (ICD-10-Erstdiagnosen Fo–F6) in Fachabteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im Jahr 2004 [48]

Diagnose	Jungen	Mädchen	Gesamt
sonstige Störungen des Kindes- und Jugendalters (F94–99)	4,3%	2,6%	3,5%
emotionale Störungen (F93)	5,3%	5,1%	5,2%
Störungen des Sozialverhaltens kombiniert mit emotionalen Störungen (F92)	23,4%	17,0%	20,4%
Störungen des Sozialverhaltens (F91)	10,7%	6,1%	8,6%
hyperkinetische Störungen (F90)	17,0%	3,0%	10,4%
Entwicklungsstörungen (F8)	3,0%	1,0%	2,0%
Intelligenzminderung (F7)	1,6%	0,8%	1,3%
Persönlichkeitsstörungen (F6)	2,1%	6,4%	4,1%
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F5)	0,7%	9,1%	4,7%
sonstige neurotische Störungen (F40–42, F44–48)	4,4%	6,8%	5,5%
Belastungs- und Anpassungsstörungen (F43)	10,7%	24,6%	17,2%
Affektive Störungen (F3)	4,9%	10,5%	7,5%
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F2)	4,7%	3,3%	4,0%
Störungen durch psychotrope Substanzen (F1)	6,7%	3,5%	5,2%
Organische psychische Störungen (Fo)	0,5%	0,3%	0,4%



Abbildung 12, Seite 27

Diagnoseverteilung von 64.096 weiblichen und 60.857 männlichen Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung mit psychischen Störungen, die im Jahr 2004 eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt haben [5]

Diagnose	Männer	Frauen	Gesamt
Sonstige psychische Störungen	3,2 %	5,3 %	4,2 %
Persönlichkeitsstörungen (F6)	2,9 %	3,2 %	3,1 %
Essstörungen (F50)	0,3 %	2,6 %	1,5 %
Somatoforme Störungen (F45)	5,0 %	9,0 %	7,0 %
Reaktionen auf schwere Belastungs- und Anpassungsstörungen (F43)	11,1 %	20,7 %	16,1 %
Angst- und Zwangsstörungen (F40–42)	5,7 %	9,2 %	7,5 %
Affektive Störungen (F3)	17,4 %	36,1 %	27,0 %
Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen (F2)	1,6 %	1,4 %	1,5 %
Störungen durch psychotrope Substanzen (F1)	51,6 %	11,9 %	31,2 %
Organische psychische Störungen (Fo)	1,1 %	0,6 %	0,9 %

Abbildung 13, Seite 28

Verteilung von 680 behandelten Erwachsenen (mind. einmaliges Aufsuchen professioneller Hilfsangebote aufgrund psychischer Probleme) mit diagnostizierten psychischen Störungen (Lebenszeit-Prävalenz) auf verschiedene professionelle Behandlungsangebote – Mehrfachnennungen

Quelle: Bundes-Gesundheitssurvey 1998, Zusatzmodul »Psychische Störungen« – eigene Berechnungen

	Männer	Frauen	Gesamt
stationäre Einrichtungen	25,1 %	19,7 %	21,7 %
Ambulanzen und Tageskliniken	6,7 %	7,3 %	7,0 %
Ärztlicher Psychotherapeut	12,1 %	13,6 %	13,1 %
Psychologischer Psychotherapeut	19,7 %	26,9 %	24,4 %
Nervenarzt	29,0 %	29,7 %	29,5 %
Hausarzt	29,4 %	40,7 %	36,8 %
Beratungsstellen	25,1 %	19,3 %	21,3 %
andere Einrichtungen (z. B. Selbsthilfegruppe, Sozialpsychiatrischer Dienst)	18,4 %	15,1 %	16,2 %