

KALENDARI I VAKSINIMIT

Sprache: Albanisch

VAKSINIMI MOSHA

Vaksinimet duhet të kryhen sa më shpejt të jetë e mundur.

Një vlerësim i statusit të vaksinimit është dobishëm në të gjitha moshat. Çdo vaksinim që mungon duhet të kryhet menjëherë në përputhje me rekomandimet për grupin e moshës përkatëse.

Rekomandimet e Komitetit të Vaksinimit në Gjermani (STIKO), 2019/20. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



	(në javë)	Bebet			(në muaj)		Të Sapolindurit		Fëmijët			(në vjet)		Adoleshentët		Të Rriturit	
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	nga 18	nga 60			
			U4		U6	U7	U7/8	U9	U10	J1							
Rotavirusët	G1 ^a	G2	(G3)														
Tetanos		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2	N	N	A (N nëse kërkohet) ^f				
Difteria		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2	N	N	A (N nëse kërkohet) ^f				
Kolla e mirë Pertusis		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2	N	N	A3 ^f	N nëse kërkohet			
Hib Hemofilus influenza tipi b		G1	G2 ^b	G3	G4		N										
Polio Poliomeliti		G1	G2 ^b	G3	G4			N			A1	N	N nëse kërkohet				
Hepatiti B		G1	G2 ^b	G3	G4			N									
Pneumokokus ^c		G1		G2	G3	N										S ^g	
Meningokokus C						G1 (nga 12 muaj)				N							
Fruthi					G1	G2				N				S ^e			
Shyta Rubela					G1	G2				N							
Lia e dhenve Varicela					G1	G2				N							
HPV Papilomaviruset e njeriut										G1 ^d G2 ^d		N ^d					
Herpes zoster (Zjarr i natës)																G1 ^h G2 ^h	
Gripi Influenca																S (çdo vit)	

Datat e vaksinave të ardhshme



SHËNIME SHPJEGUESE

G IMUNITETE BAZË (deri në 4 doza vaksinë G1 – G4)

S IMUNITETI STANDARD

A IMUNITETI ME VAKSINË SUPLEMENTARE

N ARRITJA E IMUNITETIT (imunitet bazë për këdo që nuk është vaksinuar akoma ose plotësimi i një serie të papërfunduar me vakcina)

U Ekzaminimi i zbulimit të hershëm

J Ekzaminimi tek të rinjtë (J1 me moshë 12–14 vjeç)

a Vaksinimi i 1-rë duhet të bëhet qysh nga moshja 6 javëshe, varësisht vaksinës që përdoret, të nevojshme janë 2 ose 3 doza në distancë kohore prej të paktën 4 javë.

b Kjo dozë nuk kërkohet kur përdorni një vaksinë monovalente.

c Fëmijët e lindur përpara kohe marrin një dozë shtesë vaksinimi në moshën tre vjeçare, d.m.th. gjithsej 4 doza.

d Vaksinim standard për djmë dhe vajza të moshës 5 deri 14 vjeç.

Për vaksinën ndjekëse dhe për numrin e dozave të vaksinës shikoni informacionet e specializuara.

e Vaksinimi i vetëm për të gjithë personat ≥ 18 vjet, të lindur pas vitit 1970 me vaksinim të panjohur, pa vaksinim ose me vetëm një vaksinim në fëmijëri. Para se gjithash me një vaksinë MMR.

f Td-vaksinimi përtëritës çdo 10 vjet. Td-vaksinimi i ardhshëm i planifikuar si vaksinë e vetme Tdap, ose për indikacionin përkatës si vaksinim i kombinuar Tdap-IPV.

g Vaksinimi me Vaksinë-Polisaharide, vaksinimi përtëritës rekomandohet vetëm për indikacione specifike.

h Vaksinim që kryhet dy herë me vaksinën adjuvante të Herpes-zoster, në një distancë kohore minimumi 2 muaj dhe maksimumi 6 muaj.