ROBERT KOCH INSTITUT

جدول التطعيمات

اللغة: العربية

يجب إجراء التطعيمات في أقرب وقت ممكن.
يُعد فحص حالة التطعيم أمرًا مفيدًا في كل فترة عمرية. يتعين متابعة التطعيمات الناقصة على الفور، بناءً على التوصيات المعنية بكل فترة عمرية.

توصيات لجنة التطعيم الدائمة
(STIKO)، ٢٠١٩/٢٠. www.stiko.de

التطعيم / العمر	(بالأسابيع) ٦	الرضّع ٢	٣	(بالشهور) ٤	الأطفال الصغار ١١-١٤	١٥-٢٣	الأطفال ٢-٤	٥-٦	(بالسنين) ٧-٨	٩-١٤	المراهقين ١٥-١٦	١٧	الكبار بدءًا من ١٨	بدءًا من ٦٠
			U4		U6	U7	U7/8	U9	U10	J1				
فيروسات الروتا	G١ [a]	G٢	(G٣)											
التيتانوس		G١	G٢	G٣	G٤		N	A١	N	A٢		N	A (إن وجد N) [f]	
الدفتيريا		G١	G٢	G٣	G٤		N	A١	N	A٢		N	A (إن وجد N) [f]	
السعال الديكي سعال ديكي		G١	G٢	G٣	G٤		N	A١	N	A٢		N	A٣ [f]	إن وجد N
التهاب السحايا المستدمية النزلية النوع ب		G١	G٢ [b]	G٣	G٤		N							
شلل الأطفال شلل الأطفال		G١	G٢ [b]	G٣	G٤				N		A١	N	إن وجد N	
التهاب الكبد الوبائي (ب)		G١	G٢ [b]	G٣	G٤					N				
المكورة الرئوية [c]		G١		G٢	G٣								S [g]	
النيسرية السحائية (جـ)					G١ (بدءًا من ١٢ شهر)					N				
الحصبة					G١	G٢				N			S [e]	
النكاف، الحميراء					G١	G٢				N				
الجُديري جدري الماء					G١	G٢				N				
الورم الحليمي البشري فيروس الورم الحليمي البشري										G١ [d] G٢ [d]	N [d]			
الهربس النطاقي													G١ [h] G٢ [h]	
النزلة الوافدة إنفلونزا													S (سنويًا)	

مواعيد التطعيم المقبلة

الإيضاحات

- G (حتى أربع جرعات تطعيم G١ – G٤) **التحصين الأساسي**
- S **التطعيم القياسي**
- A **الجرعة المنشطة**
- N (التحصين الأساسي لكل من لم يحصلوا على تطعيم بعد **التطعيم الاستدراكي** أو استكمال سلسلة تطعيمات غير كاملة)
- U **فحص الكشف المبكر**
- J (لـ١ بعمر ١٢ - ١٤ عامًا) **فحص المراهقين**

[a] يتعين إتمام التطعيم الأول. بدءًا من سن ٦ أسابيع، ويبلغ عدد الجرعات اللازمة اثنين أو ثلاثة بحسب اللقاح المُستخدم، على أن يفصل بين كل منها فترة لا تقل عن ٤ أسابيع.

[b] من الممكن الاستغناء عن هذه الجرعة في حالة استخدام لقاح أحادي.

[c] يحصل الأطفال المبتسرين على جرعة لقاح إضافية في سن ٣ أشهر، أي ٤ جرعات إجمالاً.

[d] يتم التطعيم القياسي للأطفال والمراهقين بعمر ٩ - ١٤ عامًا بجرعتي لقاح يفصل بينهما فترة لا تقل عن خمسة أشهر، وفي حالة التطعيمات الاستدراكية في عمر يزيد على ١٤ عامًا أو في حالة تم التطعيم بفترة فاصلة تقل عن ٥ أشهر، يلزم الحصول بين الجرعة الأولى والثانية على جرعة ثالثة (انتبه للمعلومات المتخصصة).

[e] التطعيم لمرة واحدة لكافة المولودين بعد عام ١٩٧٠ بعمر ١٨ عامًا أو أكثر ولم يتضح وضع تطعيمهم أو لم يتم تطعيمهم قط أو تم تطعيمهم مرة واحدة فحسب خلال مرحلة الطفولة.
يُفضل تطعيم الحصبة والتهاب الغدة النكافية والحصبة الألمانية.

[f] جرعة منشطة ضد التيتانوس والدفتريا كل ١٠ سنوات. تطعيم التيتانوس والدفتريا المقرر التالي يكون مرة واحدة في إطار تطعيم التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي اللاخلوي أو - في حالة توافر الأعراض المعنية - في إطار تطعيم مشترك ضد التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي اللاخلوي وفيروسات شلل الأطفال غير النشطة.

[g] التطعيم بلقاح عديد السكاريد ٢٣ مصل.

[h] التطعيم مرتين بلقاح مُعطل مساعد ضد الهربس النطاقي
يفصل بينهما فترة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ٦ أشهر