

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

Sprache: Bulgarisch

Ваксините трябва да се правят възможно най-рано.

Проверката на имунизационния статус е целесъобразна на всяка възраст. Липсващите ваксини следва да се направят незабавно, в съответствие на препоръките за съответната възраст.

Препоръка на Постоянната комисия по ваксинациите на Германия (STIKO), 2019/20. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



ВАКСИНА	ВЪЗРАСТ	(навършени седмици)		(навършени месеци)		Деца		Юноши		Възрастни					
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	с 18	с 60
		U4		U6		U7		U7/8		U9		U10		J1	
Ротавирус		G1 ^a	G2	(G3)											
Тетанус			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A (съотв. N) ^f		
Дифтерия			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A (съотв. N) ^f		
Коклюш Пертусис			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A3 ^f	съотв. N	
ХИБ Хемофилус инфлуенце тип Б			G1	G2 ^b	G3	G4	N								
Детски паралич Полиомиелит			G1	G2 ^b	G3	G4	N			A1	N	съотв. N			
Хепатит В			G1	G2 ^b	G3	G4	N								
Пневмококи ^c			G1		G2	G3	N								S ^g
Менингококи С			G1 (с навършени 12 месеца)				N								
Морбили			G1				G2	N						S ^e	
Паротит, рубеола			G1				G2	N							
Дребна шарка Варицела			G1				G2	N							
HPV Човешки папилома вирус									G1 ^d	G2 ^d	N ^d				
Херпес зостер													G1 ^h	G2 ^h	
Грип Инфлуенца													S (ежегодно)		

Следващи срокове за имунизация



ОБЯСНЕНИЯ

- G** ПЪРВИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ (до 4 приема G1 - G4)
- S** СТАНДАРТНА ИМУНИЗАЦИЯ
- A** РЕИМУНИЗАЦИЯ
- N** НАВАКСВАЩА ИМУНИЗАЦИЯ (Първична имунизация на всички още неваксинирани лица или такива с незавършена имунизационна ерия)
- U** Преглед за ранно разпознаване
- J** Преглед на юноши (J1 на възраст от 12 до 14 години)

- a** Първата ваксинация може да се направи още след навършване на 6 седмици, в зависимост от използваната ваксина се изискват 2 или 3 дози през интервал от поне 4 седмици.
- b** При прилагане на моновалентна ваксина тази доза може да отпадне.
- c** Новородените получават допълнителна доза на възраст от 3 месеца, т.е. общо 4 дози.
- d** Стандартна ваксинация на момичета и момчета на възраст между 9 и 14 години. За наваксване на ваксинациите и брой на дозите ваксина – виж информацията за фармацевтичния препарат!
- e** Еднократна ваксинация за всички родени след 1970 лица над 18 години с неясен имунизационен статус, без ваксинация или само с една ваксинация в детска възраст. За предпочитане е да се направи с ваксина против морбили, паротит, рубеола.

- f** Реимунизация срещу тетанус и дифтерия на всеки 10 години. Следващ прием на ваксина срещу тетанус и дифтерия еднократно като комбинирана ваксина TdA^P (против дифтерия, тетанус, коклюш) или при съответни индикации като комбинирана ваксина TdA^P-IPV (против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит).
- g** Ваксинирането с полизахаридна ваксина, наваксваща имунизация се препоръчва само за определени индикации.
- h** Двукратна ваксинация с адювантната ваксина срещу херпес зостер на интервали от минимум 2 до максимум 6 месеца.