



واکسیناسیون باید در زودترین زمان ممکن صورت بگیرد. بررسی وضعیت واکسیناسیون در هر سنی اهمیت دارد. واکسیناسیون‌هایی که انجام نشده‌اند باید هرچه عاجل بر حسب توصیه‌های مربوط به سن، جبران شوند.

واکسیناسیون سن

کلان سالان	جوانان (بر حسب سال)			اطفال		اطفال خردسال		نوزادان (بر حسب ماه)						
	60 از	18 از	17	15-16	9-14	7-8	5-6	2-4	15-23	11-14	4	3	2	6
					J1	U10	U9	U7/8	U7	U6		U4		
												(G3)	G2	<sup>a</sup> G1
	A (در صورت <sup>f</sup> N)	N	A2	N	A1	N	N	G4	G3	G2	G1			
	A (در صورت <sup>f</sup> N)	N	A2	N	A1	N	N	G4	G3	G2	G1			
	A3 (در صورت <sup>f</sup> N)	N	A2	N	A1	N	N	G4	G3	G2	G1			
								N	G4	G3	<sup>b</sup> G2	G1		
	در صورت N	N	A1	N				G4	G3	<sup>b</sup> G2	G1			
					N			G4	G3	<sup>b</sup> G2	G1			
	<sup>g</sup> S							N	G3	G2		G1		
					N			G1 (از 12 ماه)						
		<sup>e</sup> S			N			G2	G1					
					N			G2	G1					
					N			G2	G1					
			<sup>d</sup> N		<sup>d</sup> G2	<sup>d</sup> G1								
	<sup>h</sup> G2	<sup>h</sup> G1												
	S (سالانه)													



- روتا وایرس
- تیتانوس
- دیفتتری
- سیاه سرفه
- هموفیلوس انفلوانزا
- هموفیلوس انفلوانزا نوع b
- فلج اطفال
- پولیومیلیت
- هپاتیت B
- استرپتوکوک نومونیا<sup>g</sup>
- مننگوکوک C
- سرخک
- اوربون، سرخچه
- آبله مرغان
- واریسلا
- HPV
- پاپیلوما وایرس انسانی
- واریسلا زوستر
- انفلوانزا
- انفلوانزا

توضیحات

<sup>e</sup> واکسیناسیون یک باره، برای تمام افراد متولد بعد از 1970 که 18 سال سن دارند، با وضعیت واکسیناسیون نامشخص، بدون واکسیناسیون یا تنها با یک واکسیناسیون در طفولیت.  
<sup>f</sup> ترجیحاً با یک واکسن MMR، واکسیناسیون مجدد- Td هر 10 سال صورت می‌گیرد. تاریخ واکسن Td بعدی، یک بار به حیث Tdap و نیز در صورت وجود نشانه مربوطه، به حیث واکسیناسیون ترکیبی Tdap-IPV صورت می‌گیرد.  
<sup>g</sup> واکسیناسیون با واکسن پولی سکراید 23 ظرفیتی.  
<sup>h</sup> واکسیناسیون دوم با واکسن واریسلا زوستر مرده در فاصله زمانی از حداقل 2 الی حداکثر 6 ماه

<sup>a</sup> باید از سن 6 هفتگی صورت بگیرد، بر حسب ماده واکسن مورد استفاده، اغلب 2 و یا 3 دوز در فاصله زمانی حداقل 4 هفته ضرورت دارد.  
<sup>b</sup> در صورت استفاده از واکسن تک ظرفیتی، این دوز قابل حذف است.  
<sup>c</sup> نوزادان نارس در سن 3 ماهگی دوز اضافی واکسن دریافت می‌کنند. یعنی در مجموع 4 دوز.  
<sup>d</sup> واکسیناسیون استاندارد برای اطفال و جوانان در سن بین 9 الی 14 سال با 2 دوز واکسن در فاصله زمانی حداقل 5 ماه صورت می‌گیرد، واکسیناسیون جبرانی در سن <14 سالگی شروع شده یا در فاصله زمانی واکسیناسیون >5 ماه بین دوز 1 و 2. دوز 3 نیز ضرورت دارد (به معلومات تخصصی توجه کنید).

<sup>G</sup> (در الی 4 واکسیناسیون جزئی G1 - G4) امن‌سازی اساسی  
<sup>S</sup> واکسیناسیون امن  
<sup>A</sup> واکسیناسیون مجدد  
<sup>N</sup> پیگیری واکسین (واکسیناسیون اولیه اشخاصی که تا هنوز واکسین نشده اند یا دوره های واکسیناسیون خود را مکمل نکرده اند)  
<sup>U</sup> معاینه تشخیص زودهنگام  
<sup>J</sup> معاینه جوانان (J1 در سن 12-14 سال)