

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



IMPfung	ALTER	in Wochen:		in Monaten							in Jahren									
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60	
		U4		U5		U6			U7		U7a/U8		U9		U10		U11/11		J2	
Rotaviren		G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)															
Tetanus <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N			A1	N	A2	N		A <sup>e</sup>			
Diphtherie <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N			A1	N	A2	N		A <sup>e</sup>			
Keuchhusten <sup>b</sup> Pertussis		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N			A1	N	A2	N		A3 <sup>e</sup>	N		
Hib <sup>b</sup> <i>Haemophilus influenzae</i> Typ b		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N											
Kinderlähmung <sup>b</sup> Poliomyelitis		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>				N				A1			N			
Hepatitis B <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>						N								
Pneumokokken <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N											S <sup>g</sup>
Meningokokken C								G1						N						
Masern						G1	N		G2					N						S <sup>f</sup>
Mumps, Röteln						G1	N		G2					N						
Windpocken Varizellen						G1	N		G2					N						
HPV Humane Papillomviren														G1 <sup>d</sup> G2 <sup>d</sup>	N					
Herpes zoster																				G1 <sup>h</sup> G2 <sup>h</sup>
Grippe Influenza																				S (jährlich)

### Nächste Impftermine



### ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter  $\geq$  15 Jahren oder bei Impfabstand von  $<$  5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

- f** Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen  $\geq$  18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
  - g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
  - h** Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.