

KALENDAR CIJEPLJENJA

Sprache: Kroatisch

Cijepljenja se trebaju obaviti što je prije moguće.

Smisleno je obaviti procjenu stanja procijepljenosti u svim životnim dobima. Ako se koje cijepljenje propusti, onda se to cjepivo treba dati čim prije, sukladno preporukama za tu životnu dob.

Preporuke njemačke Stalne komisije za cijepljenje (STIKO), 2019/20. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



CJEPIVO	DOB	(u tjednima)			(po mjesecima)		(po godinama)		(po godinama)		Odrasli				
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	od 18	od 60
		U4			U6	U7	U7/8	U9	U10	J1					
Rotavirusi		G1 ^a	G2	(G3)											
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		N	A (N po potrebi) ^f		
Difterija		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		N	A (N po potrebi) ^f		
Hripavac Pertussis		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		N	A3 ^f	N po potrebi	
Hib <i>Haemophilus influenzae</i> Tip b		G1	G2 ^b	G3	G4	N									
Dječja paraliza Poliomyelitis		G1	G2 ^b	G3	G4	N				A1	N	N po potrebi			
Hepatitis B		G1	G2 ^b	G3	G4	N									
Pneumokokna infekcija ^c		G1		G2	G3	N							S ^g		
Meningokokna infekcija C						G1 (od 12 mjeseci)		N							
Ospice						G1	G2	N				S ^e			
Zaušnjaci Crvenka						G1	G2	N							
Vodne kozice Varicella						G1	G2	N							
HPV Čovječji papilloma virus										G1 ^d	G2 ^d	N ^d			
Herpes zoster												G1 ^h	G2 ^h		
Gripa Influenza												S (godišnje)			

Datumi narednih cijepljenja



OBRAZLOŽENJA

- G** BAZNA IMUNIZACIJA (do 4 doze G1 – G4 cjepiva)
- S** STANDARDNO CIJEPLJENJE
- A** PONOVRNO CIJEPLJENJE – BUSTER DOZA
- N** NADOKNADA CIJEPLJENJA (bazna imunizacija svih koji dosad nisu bili cijepljeni ili dopuna necelovite serije cijepljenja)
- U** Pregled za rano otkrivanje
- J** Pregled mladeži (J1 u dobi od 12–14 godina)

- a** Prvo cijepljenje trebalo bi uslijediti već od 6. tjedna života, a ovisno o korištenom cjepivu potrebne su 2 odnosno 3 doze u razmaku od najmanje 4 tjedana.
- b** Ova doza nije potrebna prilikom uporabe monovalentnog cjepiva.
- c** Nedonoščad prima jednu dodatnu dozu cjepiva u dobi od tri mjeseca, dakle ukupno 4 doze.
- d** Standardna imunizacija za djevojčice i dečake od 9 do 14 godina. Za naknadne vakcinacije i ukupan broj doza za vakcinaciju pogledajte stručne informacije!
- e** Jednokratno cijepljenje svih punoljetnih osoba koje su rođene nakon 1970. godine, koje nisu nijednom ili su samo jednom cijepljene u djetinjstvu ili za koje se ne zna točno stanje procijepljenosti. Preferira se MMR cjepivo.

- f** Td docjepljivanje svakih 10 godina. Sljedeće potrebno Td cijepljenje jednokratno kao Tdap ili u slučaju odgovarajuće indikacije kombiniranim cjepivom Tdap-IPV.
- g** Cijepljenje polisaharidnim cjepivom, docjepljivanje se preporuča samo kod određenih indikacija.
- h** Dvokratno cijepljenje adjuvantiranim cjepivom protiv herpes zosteru u razmacima od najmanje dva (2) do najviše šest (6) mjeseci.