



Sprache: **Polnisch**

WIEK	(w tygodniach)	niemowlęta (w miesiącach)			małe dzieci		dzieci (w latach)			młodzież		dorośli			
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	od 18	od 60		
	SZCZEPIENIE		U4		U6		U7		U7A/8		U9		U10		J1
Tęžec		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (co 10 lat, N w razie potrzeby) ^f					
Błonica		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (co 10 lat, N w razie potrzeby) ^f					
Krztusiec Koklusz		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A ^f (N w razie potrzeby)					
Nagminne porażenie dziecięce Poliomylitis		G1	G2 ^a	G3	G4	N				A1	N (w razie potrzeby)				
Wirusowe zapalenie wątroby typu B		G1	G2 ^a	G3	G4	N									
Hib <i>Haemophilus influenzae</i> typu b		G1	G2 ^a	G3	G4	N									
Pneumokoki ^g		G1		G2	G3	N				S ^c					
Rotawirusy	G1 ^b	G2	(G3)												
Meningokoki Grupa serologiczna C					G1 (od 12 miesięcy)		N								
Odra					G1	G2	N			S ^d					
świnka różyczka					G1	G2	N								
Ospa wietrzna Varicella					G1	G2	N								
Grypa Influenza											S (co roku)				
HPV Wirusy brodawczaka ludzkiego								G1 ^e	G2 ^e	N ^e					

Najbliższe terminy szczepień



Gefördert durch:

 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

- OBJAŚNIENIA**
- G** PODSTAWOWE UODPORNIENIE (w postaci do 4 szczepionek częściowych G1–G4)
 - S** STANDARDOWE SZCZEPIENIE
 - A** SZCZEPIENIE PRZYPOMINAJĄCE
 - N** SZCZEPIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (podstawowe uodpornienie wszystkich jeszcze nieszczepionych lub dokończenie niekompletnej serii szczepień)
 - U** Badanie w celu wczesnego rozpoznania
 - J** Badanie młodzieży (J1 w wieku od 12 do 14 lat)

- ^a W przypadku zastosowania szczepionki monowalentnej można zrezygnować z tej dawki.
- ^b Pierwsze szczepienie powinno nastąpić już w wieku 6 tygodni, w zależności od użytej szczepionki wymagane są 2 lub 3 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni.
- ^c Szczepienie szczepionką polisacharydową, szczepienie przypominające zalecane tylko dla określonych wskazań.
- ^d Jednorazowe szczepienie dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, bez szczepienia lub z tylko jednym szczepieniem w dzieciństwie. Szczególnie jedną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce.
- ^e Standardowe szczepienie dla dziewcząt w wieku od 9 do 14 lat. Odnośnie późniejszych szczepień i liczby dawek szczepiennych należy przestrzegać wskazań zawartych w informacji fachowej.
- ^f Szczepienie przypominające przeciwko tężcowi i błonicy co 10 lat. Następne przypadające szczepienie przeciwko tężcowi i błonicy jednorazowo w postaci szczepionki DTaP lub w przypadku odpowiedniego wskazania w postaci szczepionki skojarzonej IPV.
- ^g Wcześnieiki otrzymują dodatkową dawkę szczepionki w wieku trzech miesięcy, tzn. razem 4 dawki.