

**Szczepienia powinny odbywać się możliwie najwcześniej.**

Kontrola statusu szczepienia ma sens w każdym wieku. Brakujące szczepienia powinny być uzupełnione od razu, zgodnie z zaleceniami dla danego wieku.

**Zalecenia Stałej Komisji ds. Szczepień  
(STIKO), 2019/20. www.stiko.de**



SZCZEPIENIE	WIEK	(w tygodniach)			(w miesiącach)		(w latach)			dorosli						
		niemowlęta	małe dzieci	dzieci	młodzież	dorośli	od 18	od 60								
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	od 18	od 60	
			U4			U6	U7	U7/8	U9	U10	J1					
Rotawirusy		G1 <sup>a</sup>	G2	(G3)												
Tężec			G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A (N w razie potrzeby) <sup>f</sup>		
Błonica			G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A (N w razie potrzeby) <sup>f</sup>		
Krzusiec Koklusz			G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A3 <sup>f</sup>	N w razie potrzeby	
Hib <i>Haemophilus influenzae</i> typu b			G1	G2 <sup>b</sup>	G3	G4		N								
Nagminne porażenie dziecięce Polioomyelitis			G1	G2 <sup>b</sup>	G3	G4			N		A1		N	N w razie potrzeby		
Wirusowe zapalenie wątroby typu B			G1	G2 <sup>b</sup>	G3	G4			N							
Pneumokoki <sup>c</sup>			G1		G2	G3		N							S <sup>g</sup>	
Meningokoki C						G1 (od 12 miesięcy)				N						
Odra						G1	G2							S <sup>e</sup>		
Świnka różyczka						G1	G2									
Ospa wietrzna Varicella						G1	G2									
HPV Wirusy brodawczaka ludzkiego											G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>		N <sup>d</sup>		
Półpasiec															G1 <sup>h</sup>	G2 <sup>h</sup>
Grypa Influenza															S (co roku)	

Najbliższe terminy szczepień



**OBJAŚNIENIA**

- G** PODSTAWOWE UODPORNIENIE (w postaci do 4 szczepionek zęściowych G1 – G4)
- S** STANDARDOWE SZCZEPIENIE
- A** SZCZEPIENIE PRZYPOMINAJĄCE
- N** SZCZEPIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (podstawowe uodpornienie wszystkich jeszcze nieszczepionych lub dokończenie niekompletnej serii szczepień)
- U** Badanie w celu wczesnego rozpoznania
- J** Badanie młodzieży (J1 w wieku od 12 do 14 lat)

- a** Pierwsze szczepienie powinno nastąpić już w wieku 6 tygodni, w zależności od użytej szczepionki wymagane są 2 lub 3 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni.
- b** BW przypadku zastosowania szczepionki monowalentnej można zrezygnować z tej dawki.
- c** Wcześnieiki otrzymują dodatkową dawkę szczepionki w wieku trzech miesięcy, tzn. razem 4 dawki.
- d** Szczepienie standardowe dla dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do 14 lat. Odnośnie późniejszych szczepień i liczby dawek szczepiennych należy przestrzegać wskazań zawartych w informacji fachowej.
- e** Jednorazowe szczepienie dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, bez szczepienia lub z tylko jednym szczepieniem w dzieciństwie. Szczególnie jedną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce.

- f** Szczepienie przypominające przeciwko tężcowi i błonicy po 10 lat. Następane przypadające szczepienie przeciwko tężcowi i błonicy jednorazowo w postaci szczepionki DTaP lub w przypadku odpowiedniego wskazania w postaci szczepionki skojarzonej IPV.
- g** Szczepienie szczepionką polisacharydową, szczepienie przypominające zalecane tylko dla określonych wskazań.
- h** Dwukrotne szczepienie szczepionką adjuwantową przeciwko wirusowi półpaśca w odstępie wynoszącym co najmniej 2 miesiące do maksymalnie 6 miesięcy.