

CALENDAR PENTRU VACCINARE

Sprache: Rumänisch

Vaccinările trebuie să fie administrate cât mai timpuriu posibil.

O evaluare a stadiului vaccinărilor este importantă la orice vârstă. Orice vaccinări care lipsesc trebuie administrate imediat, conform recomandărilor pentru grupa de vârstă respectivă.

Recomandările Comitetului German Permanent pentru vaccinare (STIKO), 2019/20. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



VACCINARE	VÂRSTĂ	(în săptămâni)		(în luni)		Sugari		Copii		(în ani)		Adolescenți		Adulți	
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	de la 18	la 60
				U4	U6		U7	U7/8	U9	U10	J1				
Rotavirusuri		G1 ^a	G2	(G3)											
Tetanoș			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A (N dacă este necesară) ^f		
Difterie			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A (N dacă este necesară) ^f		
Tuse convulsivă Pertussis			G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2	N	A3 ^f	N dacă este necesară	
Hib Haemophilus influenzae de tip b			G1	G2 ^b	G3	G4	N								
Polio Poliomielită			G1	G2 ^b	G3	G4	N			A1	N	N dacă este necesară			
Hepatită B			G1	G2 ^b	G3	G4	N								
Pneumococcus ^c			G1		G2	G3	N								S ^g
Meningococcus C						G1 (de la 12 luni)		N							
Pojar						G1	G2	N			S ^e				
Oreion Rubeolă						G1	G2	N							
Varicelă						G1	G2	N							
HPV Virusuri Papiloma uman								G1 ^d G2 ^d		N ^d					
Zona zoster												G1 ^h G2 ^h			
Gripă												S (anual)			

Datele următoarelor vaccinări



NOTE EXPLICATIVE

G IMUNIZARE DE BAZĂ (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)

S IMUNIZARE STANDARD

A IMUNIZARE DE RAPEL

N IMUNIZAREA PERSOANELOR NEVACCINATE ANTERIOR (imunizare de bază pentru orice persoană care nu a fost încă vaccinată sau finalizarea unei serii nefinalizate de vaccinări)

U Examinarea pentru recunoaștere timpurie

J Examinarea tinerilor (J1 cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani)

a Prima vaccinare trebuie făcută deja de la vârsta de 6 săptămâni, iar în funcție de vaccinul folosit sunt necesare 2 sau 3 doze administrate la un interval de cel puțin 4 săptămâni între ele.

b Această doză nu este necesară la folosirea unui vaccin monovalent.

c Copiii prematuri primesc o doză suplimentară de vaccin la vârsta de trei luni, și anume un total de 4 doze.

d Vaccinare standard pentru fete cu vârste între 9 și 14 ani. Pentru vaccinările de rapel și numărul dozelor de vaccin, vezi informațiile de specialitate!

e O vaccinare singulară pentru toți indivizii născuți după anul 1970 (≥ 18ani), cu un stadiu neclar al vaccinării, care nu au fost imunizați, sau cărora li s-a administrat doar un singur vaccin când erau copii. De preferat cu un vaccin MMR (antirubeolă și antipojar).

f Imunizare de rapel cu vaccin diftero-tetanic la fiecare 10 ani. Următorul vaccin diftero-tetanic (Td) necesar o singură dată ca vaccin Diftero-Tetano-Pertussis (Tdap), respectiv ca vaccin combinat Tdap-IPV (antipoliomielitic), dacă există recomandare în acest sens.

g Vaccinare cu vaccin polizaharidic, imunizarea de rapel este indicată doar în cazul recomandărilor specifice.

h Vaccinarea de două ori cu vaccinul adjuvant pentru zona zoster la interval de 2 până la maximum 6 luni.