

КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК

Sprache: Russisch

Прививки должны проводиться как можно раньше согласно утвержденным срокам вакцинации.

Оценку прививочного статуса целесообразно проводить в любом возрасте. Любые недостающие прививки следует проводить немедленно, в соответствии с рекомендациями для соответствующей возрастной группы.

Рекомендации Постоянного комитета по вакцинации Германии (STIKO), 2019/20. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



ВАКЦИНАЦИЯ ВОЗРАСТ

	(в неделях)	Новорожденные (в месяцах)			Младенцы		Дети (в годах)			Подростки		Взрослые		
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	с 18	с 60
		U4			U6	U7	U7/8	U9	U10	J1				
Ротавирус	G1 ^a	G2	(G3)											
Столбняк		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A ^f	(N в случае необходимости)
Дифтерия		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A ^f	(N в случае необходимости)
Коклюш		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A3 ^f	N в случае необходимости
Гемофильная инфекция типа b		G1	G2 ^b	G3	G4		N							
Полиомиелит		G1	G2 ^b	G3	G4		N			A1		N	N	(в случае необходимости)
Гепатит B		G1	G2 ^b	G3	G4		N							
Пневмококк ^c		G1		G2	G3		N							S ^g
Менингококк C						G1 (с 12 месяцев)				N				
Корь					G1	G2				N			S ^e	
Свинка Краснуха (MMR)					G1	G2				N				
Ветряная оспа					G1	G2				N				
ВПЧ Вирусы папилломы человека										G1 ^d G2 ^d		N ^d		
Герпес зостер														G1 ^h G2 ^h
Грипп														S (ежегодно)

Даты следующих прививок



ПОЯСНЕНИЯ

G БАЗОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (включая до 4-х этапов G1 – G4)

S СТАНДАРТНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ

A РЕВАКЦИНАЦИЯ

N НАВЕРСТЫВАЮЩАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (Основная иммунизация всех лиц, которые до текущего момента не были вакцинированы или завершение неполной серии прививок)

U Профилактическое обследование

J Обследование подростков (J1 – в возрасте 12–14 лет)

a Первую вакцинацию необходимо проводить в возрасте от 6 недель. В зависимости от используемой вакцины следует ввести 2 или 3 дозы с перерывом как минимум 4 недели.

b Эта доза не требуется при использовании моновалентной вакцины.

c Недоношенные дети получают дополнительную дозу вакцины в возрасте трех месяцев, т.е. всего 4 дозы.

d Стандартная прививка для девочек и мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет. Сведения о навестывающей иммунизации и количестве доз см. в информации о препарате.

e Разовую вакцинацию для всех лиц, начиная с возраста 18 лет, родившихся после 1970 года, с неясным анамнезом вакцинации, а также для лиц, которые не были привиты или были привиты лишь однократно в детстве рекомендуется проводить вакциной MMR.

f Ревакцинация против столбняка и дифтерии рекомендована каждые 10 лет. Следующую плановую вакцинацию против столбняка и дифтерии следует провести одновременно с вакцинацией против коклюша и, если требуется по конкретным показаниям, против полиомиелита.

g Полисахаридная вакцина, ревакцинация рекомендована только по конкретным показаниям.

h Двукратная прививка адьювантной вакциной от герпесзостер с интервалом от минимум 2 до максимум 6 месяцев.