

Vakcinisanje treba obaviti što je ranije moguće.

Preporučujemo proveru statusa vakcinacije u raznim starosnim dobima. U slučaju da je neko vakcinisanje propušteno, preporučujemo novu vakcinaciju u skladu sa preporukama za odgovarajući uzrast.



	(u sedmicama):		Odojčad (starost u mesecima)		Mala deca		Starija deca (starost u godinama)			Adolescenti		Odrasli			
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	≥ 18	≥ 60	
			U4		U6	U7	U7/8	U9	U10	J1					
Rotavirusi	G1 ^a	G2	(G3)												
Tetanus		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A (N prema potrebi) ^f		
Difterija		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A (N prema potrebi) ^f		
Veliki kašalj Pertussis		G1	G2	G3	G4		N	A1	N	A2		N	A3 ^f	N (prema potrebi)	
Hib Hemofilus influenza tip b		G1	G2 ^b	G3	G4		N								
Dečja paraliza Poliomijelitis		G1	G2 ^b	G3	G4			N			A1	N	N prema potrebi		
Hepatitis B		G1	G2 ^b	G3	G4			N							
Pneumokokna ^c		G1		G2	G3		N							S ^g	
Meningokokna C					G1 (od navršanih 12 meseci)					N					
Male boginje					G1	G2							S ^e		
Zauške rubeole					G1	G2									
Ovčije boginje Varičele					G1	G2									
HPV Humani papiloma virusi										G1 ^d	G2 ^d		N ^d		
Herpes zoster														G1 ^h	G2 ^h
Grip Influenza														S (godišnje)	

Naredni termini vakcinacije



OBJAŠNJENJA

- G** PRIMARNA IMUNIZACIJA (do 4 doze G1 – G4)
- S** STANDARDNA IMUNIZACIJA
- A** DOVAKCINACIJA
- N** REVAKINACIJA (primarna imunizacija osoba koje još nisu vakcinisane odnosno kompletiranje vakcinacije prema propisanom programu)
- U** Sistematski pregled
- J** Pregled dece u ranom pubertetu (J1 u uzrastu od 12 do 14 godina)

- a** Prvu vakcinaciju bi trebalo obaviti već od 6. nedelje života, a u zavisnosti od korišćenog seruma potrebne su 2 odnosno 3 doze u razmaku od najmanje 4 sedmice.
- b** Ova doza nije potrebna u slučaju primene monovalentne vakcine.
- c** Nedonoščad dobija jednu dodatnu dozu vakcine sa napunjenih tri meseca, dakle ukupno 4 doze.
- d** Standardna vakcinacija za devojčice i dečake od 9 do 14 godina. Za zaboravljene dovakcinacije i broj doza vakcina pogledati stručne informacije!
- e** Jednokratna vakcinacija svih punoletnih osoba koje su rođene nakon 1970. godine, koje nisu nijednom ili su samo jednom vakcinisane u djetinjstvu ili za koje se ne zna tačno stanje vakcinacije. Prednost se daje MMR vakcini.

- f** Td dovakcinacija svakih 10 godina. Sledeća potrebna Td vakcinacija jednokratno kao Tdap ili u slučaju odgovarajuće indikacije kombinovanom vakcinom Tdap-IPV.
- g** Vakcinisanje polisaharidnom vakcinom, dovakcinacija se preporučuje samo u slučaju određenih indikacija.
- h** Vakcina sa sadržajem herpes zoster poboljšanim adjuvansom koja se daje dva puta u razmaku od najmanje 2 do maksimalno 6 meseci.