

STIKO-Empfehlungen - Historie

Zusammengestellt von: Fachgebiet Impfprävention, Robert Koch-Institut, Berlin



Europäische
Impfwoche

Vorbeugen Schützen Impfen

Impfung gegen	STIKO-Empfehlung (erstmalige Berufung der STIKO 1972)
Masern	<p>1973 Standardimpfung (breit angewendet als MMR ab 1980)</p> <p>1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr</p> <p>2001 2. Impfung im 2. Lebensjahr</p> <p>2010 eine Dosis für nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder nur 1 Impfung in Kindheit</p>
Mumps	<p>1976 Standardimpfung (breit angewendet als MMR ab 1980)</p> <p>1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr</p> <p>2001 2. Impfung ab 2. Lebensjahr</p>
Röteln	<p>1973 Standardimpfung für alle Mädchen, ab 1980 alle Kinder</p> <p>1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr</p> <p>2001 2. Impfung im 2. Lebensjahr</p>
Diphtherie	1976 Standardimpfung (1. Impfkalender der STIKO, breit angewendet bereits ab 1960)
Tetanus (Wundstarrkrampf)	1976 Standardimpfung (1. Impfkalender der STIKO, breit angewendet bereits ab 1960)
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	<p>1976 Standardimpfung als Schluckimpfung (OPV) (1. Impfkalender der STIKO, breit angewendet bereits ab 1962)</p> <p>1998 als inaktivierter Impfstoff (IPV)</p>
Influenza	<p>1982 für chronisch Kranke, ab 60 Jahre und für med. Personal</p> <p>2002 Standardimpfung ab 60 Jahre; Indikationsimpfung für chronisch Kranke und med. Personal</p> <p>2010 Indikations-Ausweitung auf Schwangere</p>
Pocken	1983 Impfung eingestellt
BCG (Tuberkulose)	1988 Impfung eingestellt
Hib	1990 Standardimpfung
Pertussis (Keuchhusten)	<p>1991 Standardimpfung (mit Ganzkeimimpfstoff, ab 1994 azellulär)</p> <p>1997 Vervollständigung bzw. Nachholen der Grundimmunisierung bis zum vollendeten 5. Lebensjahr</p> <p>2001 zusätzliche Auffrischimpfung von 9–17 Jahren</p> <p>2009 für Erwachsene nächstfällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombi-Impfung</p>
Hepatitis B	1995 Standardimpfung
Pneumokokken	<p>2003 Standardimpfung, einmalig Pnk-Polysaccharid-Impfstoff \geq 60 Jahre</p> <p>2006 für alle Kinder bis 24 Monate mit Pnk-Konjugat-Impfstoff</p> <p>2016 Aktualisierung zur Indikationsimpfung von Risikogruppen (sequenzielle Impfung) und Senioren</p>
Varizellen (Windpocken)	<p>2004 Standardimpfung mit 1 Dosis</p> <p>2009 Erweiterung auf 2 Dosen, zeitgleich mit MMR</p>
Meningokokken	<p>2006 für alle Kinder im 2. Lebensjahr mit konjugierten MenC-Impfstoff</p> <p>Nachholen fehlende Grundimmunisierung bis zum 18. Geburtstag</p>
HPV	<p>2007 Standardimpfung Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren</p> <p>2014 Impfalter 9-14 Jahre mit Nachholimpfung bis zum 18. Geburtstag</p> <p>2018 Standardimpfung Jungen von 9-14 Jahren mit Nachholimpfung bis zum 18. Geburtstag</p>
Rotaviren	2013 Standardimpfung für Säuglinge