

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



IMPfung	ALTER	in Wochen		in Monaten							in Jahren												
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60				
		U4		U5			U6				U7		U7a/U8		U9		U10		U11/11		J2		
Rotaviren		G1 ^a		G2	(G3)																		
Tetanus ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c				N			A1	N	A2	N				A ^e			
Diphtherie ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c				N			A1	N	A2	N				A ^e			
Keuchhusten ^b Pertussis		G1	N	G2	N	G3 ^c				N			A1	N	A2	N				A3 ^e	N		
Hib ^b <i>Haemophilus influenzae</i> Typ b		G1	N	G2	N	G3 ^c				N													
Kinderlähmung ^b Poliomyelitis		G1	N	G2	N	G3 ^c					N				A1					N			
Hepatitis B ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c							N										
Pneumokokken ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c				N												S ^g	
Meningokokken C								G1						N									
Masern						G1	N		G2					N								S ^f	
Mumps, Röteln						G1	N		G2					N									
Windpocken Varizellen						G1	N		G2					N									
HPV Humane Papillomviren														G1 ^d	G2 ^d	N							
Herpes zoster																						G1 ^h	G2 ^h
Grippe Influenza																							S (jährlich)

Nächste Impftermine



ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter \geq 15 Jahren oder bei Impfabstand von $<$ 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

- f** Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen \geq 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
 - g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
 - h** Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.