

## Impfempfehlungen im Überblick

Stand 28.09.2023

Impfung gegen	BRD	DDR	Deutschland ab 1990 bzw. STIKO-Empfehlung seit	veröffentlicht
COVID19			ab 2023 in der Regelversorgung für alle Personen ab 60 Jahre sowie im Alter von 18 bis 59 Jahren bei unvollständiger Basisimmunität ( $\geq 3$ Antigenkontakte, davon mindestens 2 Impfungen)	Epid. Bull. 21/2023: 3
Pneumokokken			<p>ab 2001 einmalige Standardimpfung mit einem Polysaccharid-Impfstoff bei Personen <math>\geq 60</math> Jahre</p> <p>ab 2006 für alle Kinder bis 24 Monate</p> <p>2016 Aktualisierung Indikationsimpfung von Risikogruppen (sequenzielle Impfung) und Senioren</p> <p>2023 Aktualisierung einmalige Standardimpfung <math>\geq 60</math> Jahre mit 20-valentem Konjugat-Impfstoff (PCV20)</p>	<p>Epid. Bull. 28/2001: 216</p> <p>Epid. Bull. 30/2006: 237</p> <p>Epid. Bull. 36/2016 und Epid. Bull. 37/2016</p> <p>Epid. Bull. 39/2022: 3</p>
Pertussis	Ganzkeimimpfstoff breit angewendet 1969–1974; nicht breit angewendet 1974–1991	ab 1964 Ganzkeimimpfstoff	<p>Standardimpfung seit 1991 (Ganzkeimimpfstoff, ab 1994 azellulärer Impfstoff)</p> <p>ab 1997 Nachholimpfung oder Vervollständigung der GI bis zum vollendeten 5. Lj.</p> <p>ab 2001 zusätzliche Auffrischimpfung im Alter von 9–17 Jahren</p>	<p>BGBI.34(1991)8:384</p> <p>Epid. Bull. 15/97: 102</p> <p>Epid. Bull. 28/2001: 204</p>

Impfung gegen	BRD	DDR	Deutschland ab 1990 bzw. STIKO-Empfehlung seit	veröffentlicht
Pertussis, Fortsetzung			ab 2009 für alle Erwachsenen die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombinationsimpfung  ab 2020 Standardimpfung für Schwangere mit Tdap-Impfstoff	Epid. Bull. 30/2009: 280  Epid. Bull. 13/2020: 3
Herpes zoster			ab 2018 für alle Personen ab 60 Jahren	Epid. Bull. 50/2018: 525
HPV			ab 2007 für alle Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren  ab 2014 Impfbefehl 9–14 Jahre mit Nachhol-Impfung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr  ab 2018 für alle Jungen im Alter von 9–14 Jahren mit Nachholimpfung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr	Epid. Bull. 12/2007: 97 ff. Neubewertung: Epid. Bull. 32/2009  Epid. Bull. 34/2014: 307  Epid. Bull. 26/2018: 233
Meningokokken			ab 2006 für alle Kinder im 2. Lebensjahr mit einem konjugierten Meningokokken-C-Impfstoff  Nachholen einer fehlenden Grundimmunisierung bis zum 18. Geburtstag	Epid. Bull. 30/2006: 236  Epid. Bull. 30/2012: 287
Varizellen			2004 Einführung als Standardimpfung mit 1 Dosis  ab 2009 Erweiterung auf 2 Dosen, zeitgleich mit MMR	Epid. Bull. 30/2004: 236; 238  Epid. Bull. 30/2009: 290
Rotaviren			ab 2013 für alle Säuglinge	Epid. Bull. 34/2013: 315

Impfung gegen	BRD	DDR	Deutschland ab 1990 bzw. STIKO-Empfehlung seit	veröffentlicht
Poliomyelitis	ab 1962 OPV	ab 1960 OPV	ab 1998 IPV	Epid. Bull. 15/1998: 104, 106
Hepatitis B			ab 1995	BGBI.39(1996)1:35
Haemophilus influenzae Typ b			ab 1990	BGBI.33(1990)11:516
FSME	ab 1982 für Risikogruppen		ab 1982 für Reisende in Risikogebiete und beruflich Exponierte	BGBI 25(1982)5:170
Influenza	ab 1982 für chronisch Kranke, alle Personen $\geq$ 60 Jahre und medizinisches Personal	ab 1960er-Jahre	ab 1982 für chronisch Kranke, alle Personen ab 60 Jahre und medizinisches Personal  Standardimpfung für alle Personen ab 60 Jahre; Indikations-impfung für chronisch Kranke und medizinisches Personal  ab 2010 Ausweitung der Indikation auf Schwangere	BGBI. 5/1982: 170  Epid. Bull. 28/2002: 228 Evaluation: BGBI 59/2016: 1606–1622  Epid. Bull. 30/2010: 287
Mumps	ab 1976, breit angewendet ab 1980		ab 1976, breit angewendet ab 1980  ab 1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr  ab 2001 2. Impfung ab 2. Lebensjahr	BGBI. 19(1976)17: 270  BGBI. 34(1991)8: 384  Epid. Bull. 28/2001: 204-205
Röteln	alle Mädchen ab 1973, alle Kinder ab 1980	Risikogruppen ab 1986, seronegative Mädchen	alle Mädchen ab 1973, alle Kinder ab 1980  ab 1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr ab 2001 2. Impfung im 2. Lebensjahr	Mädchen-Impfung: BGBI. 15(1972)17: 252 Impfung für alle Kinder: BGBI. 24(1981)7: 112  BGBI. 34(1991)8: 384  Epid. Bull. 28/2001: 204-205

Impfung gegen	BRD	DDR	Deutschland ab 1990 bzw. STIKO-Empfehlung seit	veröffentlicht
Masern	ab 1973, breit angewendet ab 1980	ab 1970	ab 1973, breit angewendet ab 1980  ab 1991 2. Impfung ab 6. Lebensjahr  ab 2001 2. Impfung im 2. Lebensjahr ab 2010 eine Dosis für alle nach 1970 geborenen Erwachsenen mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit	BGBI. 17(1974)19: 291  BGBI. 34(1991)8: 384  Epid. Bull. 28/2001: 204-205 Epid. Bull. 30/2010: 282
Tetanus	ab 1960	ab 1961	Standardimpfung	
Diphtherie	ab 1960	ab 1961	Standardimpfung	
Pocken	breit angewendet bis 1976, eingestellt 1983	breit angewendet bis 1980, eingestellt 1980	weiterhin eingestellt	

## Abkürzungen

Epid. Bull. = Epidemiologisches Bulletin des Robert Koch-Instituts

BGBI. = Bundesgesundheitsblatt

## Quellen

Fachgebiet Impfprävention des RKI (Sarah E. Wetzel-Labahn, Ole Wichmann)

Sieghart Dittmann/Waltraud Thilo: Vademekum für Impfähzte. 7., überarbeitete Auflage. VEB Gustav Fischer Verlag Jena, 1986

Ole Wichmann: Leitlinien für Schutzimpfungen. In: Impfkompndium (Hrsg.: Spiess/Heininger/Jilg), Thieme-Verlag, 8., vollständig überarbeitete Auflage, 2015: 74-80