

د هېپاټایټس B پر وړاندې د مخنیوي واکسین په اړه

هېپاټایټس B د ځیگر حساس التهاب دی چې د هېپاټایټس B ویروس (HBV) لرونکي سرایت له کبله رامنځته کیږي. دغه ویروس د ناروغ کس د وینې یا د وینې مایعاتو له لارې (د بیلګې په ډول، د جنسي اړیکې پر مهال) انتقالیږي. جنسي اړیکې ددغې ناروغۍ په انتقال کې رنډه رول لري. په صنعتي هیوادونو کې وینه او د وینې ماده کول په عمومي ډول د پیتوجینو لپاره معاینه کیږي او لدې کبله خوندي ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې دغه خطر د بلوغت په پیل سره زیاتېږي. دغه پیتوجین د امیندواري میرمنې لخوا که چیرې د هېپاټایټس مزمن ویروس ولري ماشوم ته هم لیږدېدلی شي. لدې کبله، باید ټولې امیندواري میرمنې معاینه شي. که چیرې ټیسټ مثبت وي، نوي زیږېدلي ماشوم ته به له زیږون څخه سم دستي وروسته د پري فیلکس یا وقایي واکسین ورکول کیږي. هېپاټایټس B د انفونزا په څیر نښو یا د معدې ګازو شکایت، سټرټیا او تبي سره پیلېږي. وروسته، متیازي قهوه یي رنگ خپلوي، بولي خپل رنگ له لاسه ورکوي او د پوستکي زیږېدل او د سترګو زیږېدل (زیرې) راڅرګندېږي. له اغیزمنو خلکو څخه شاوخوا یو فیصد خلک ددغې ناروغۍ له کبله مري او تر لسو فیصدو ناروغو بالغانو (په شیرخورو ماشومانو کې تر 90% پورې) باندې دغه ناروغي سختېږي؛ او ویروس په بدن کې پاتې کیږي. د هېپاټایټس B ویروس د ناروغۍ د نښو پرته هم په زماني ناروغۍ بدلیدلی شي. سخت اغیزمن شوي خلک د خپل چاپیریال لپاره د سرایت سرچینه ګڼلی شو. په جرمني کې، شاوخوا 0.3 څخه تر 0.8 پورې خلک د HBV سخته ناروغي لري؛ په نورو هیوادونو لکه افریقایي او آسیایي هیوادونو کې د سختو ناروغو کسانو شمیره څو چنده لوړه ده. که چیرې دغه ناروغي په چا سخته شي، د ځیگر سیروز او د ځیگر حجري کارسینوم اوږدمهاله ناروغي پکې رامنځته کېدلی شي. هېپاټایټس B کومه ځانګړې درملنه نلري. له هېپاټایټس B څخه د ژغورنې یوازینی لار په خپل وخت د ژغورنې واکسین کول دي.

واکسین

د هېپاټایټس B پر وړاندې واکسین د هېپاټایټس B ویروس خلتې جزونه لري چې د خمیره حجرو څخه په ګټې اخیستنې سره د جین ټکنالوژۍ میتودونو په واسطه ترلاسه شوي او بیا په عصري میتودونو سره سوچا شوي دي. که چیرې په سمه توګه وکارول شي، تر اوږدې مودې پورې ناروغي له منځه وړي، د بیلګې په ډول، د هېپاټایټس B ناروغۍ پر وړاندې خونديتوب.

د هېپاټایټس B یو واکسین درې ځله لګول کیږي. ستاسو ډاکټر تاسو ته د ژغورنې ددغه واکسین د وقفو، پیل او اوږدوالي او د هر ډول اړینو حامي واکسینونو په اړه معلومات درکولی شي. د هېپاټایټس B واکسین له نورو واکسینونو سره یو ځای هم ورکول کېدلی شي. دغه واکسین د عضلو په پیچکارۍ او که چیرې اړتیا وي د پوستکي لاندې پیچکارۍ سره ورکول کیږي. دغه پیچکارې یوازې په منټ یا کوناتي کې لګول کیږي. هغه خلک چې د ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ وي، د بیلګې په ډول، روغتیايي کارکوونکي، د ابتدایي واکسین څخه وروسته د واکسین ګټه لیدل کیږي، که چیرې اړتیا وي، واکسین دوهم ځل ورکول کیږي. د واکسین ګټه لیدلو سپارښتنه د مکروب ضد موادو نه درلودونکو ناروغانو (د بیلګې په ډول، د سرطان درملنې له کبله) ته هم کیږي. د یوه واکسین سربیره چې دلته یې یادونه وشوه، چې یوازې له هېپاټایټس B څخه ژغورنه کوي، شیرخورو او کوچنیو ماشومانو ته د واکسین کولو لپاره په یوه وخت د واکسین ترکیب (شیر برابره واکسین) چې د نورو ناروغیو څخه هم خوندي وي، شته دی. د ترکیبي واکسینونو په اړه د معلوماتو بیلې پانې ترلاسه کولای شئ.

څوک باید واکسین شي؟

1. د واکسین له جنټرۍ سره سم د هېپاټایټس B پر وړاندې ددغه واکسین ټولو هلکانو او انجونو ته چې عمر ونه یې له اته اونيو څخه پیلېږي سپارښتنه کوي. په همدې توګه، ترکیبي واکسینونه چې وړاندې یې نوم واخیستل شو هم همدغه ډول کسانو ته مناسب دي. که چیرې دغه واکسین د شیرخورۍ په دوره کې نه وي ورکول شوی وروسته یې هم هر وخت ورکولی شئ او سپارښتنه یې کیږي.
2. هغه نوي زیږېدلي ماشومان چې مور یې د هېپاټایټس B ویروس ولري له زیږون څخه سم دستي وروسته واکسین کیږي او ایمونوګلوبین ترلاسه کوي (مهم: د ابتدایي واکسین بشپړول په یاد ولرئ).
3. په هغو کسانو کې چې د کمزوري ایمني سیستم یا د شته ناروغۍ له امله د هېپاټایټس B ناروغي شديده وي، د بیلګې په ډول، د HIV او/یا هېپاټایټس C درلودونکي ناروغان، د ځیگر ناروغۍ درلودونکي ناروغان، د ډیالیز ناروغان او همداسې نور.

4. هغه کسان چې له غیرمسلکي پلوه له زیات خطر سره مخ وي لکه په کورني یا اوسیدو ځای کې د هپیتایټیس B درلودونکو کسانو سره د اړیکې له لارې، د سرایت لور خطر درلودونکي سره د جنسي اړیکې له لارې او د پیچکاری له لارې د نشه یي توکو کاروونکي، د بندیځاني ملگري، په رواني مرکزونو کې بالقوه ناروغان.
5. هغه کسان چې د مسلک له پلوه له لور خطر سره مخ وي، لکه، روغتیایي او یا د غابونو کلنیک کارکوونکي (د لابراتوار، د پاک کاري کارکوونکو او زده کوونکو په شمول)، لومړی ځواب ویوونکي، پولیس، او د لور خطر درلودونکو مرکزونو کارکوونکي لکه بندیځانه، د پناه غوښتونکو مرکز، د معیوبو کسانو مرکزونه.
6. گرمسیرو یا نیمه گرمسیرو سیمو ته تلونکي مسافریڼ چې د هپیتایټیس B ناروغي پکې په لوره کچه رامنځته کیږي؛ د انفرادي خطر ارزونې ته اړتیا ده.

څوک باید واکسین نه شي؟

هر هغه څوک چې سخته ناروغي او ورسره تبه (له 38.5°C څخه پورته) ولري او درملني ته اړتیا لري باید واکسین نه شي. واکسین وروسته له هغې کله چې د ناروغۍ نښې له منځه لاړې شي ورکول کېدلی شي. د امیندواری پر مهال، واکسین یوازې هغه وخت ورکولای شي کله چې د سرایت سخت او څرگند خطر موجود وي. که چېرې تاسو د واکسین له کوم عناصر سره سخت حساسیت ولري یا که چېرې تاسو د هپیتایټیس B تیر واکسین څخه وروسته د ناروغۍ کومې نښې لیدلې وي واکسین ورکونکی به تاسو ته د واکسین د اړتیا او د دوام د انتخابونو په اړه مشوره درکړي.

له واکسین څخه وروسته کړنې

واکسین شوی کس ځانگړي آرام ته اړتیا نه لري خو له واکسین څخه تر دریو ورځو پورې باید له غیرمعمول فزیکي عمل څخه ډډه وکړي. هغه کسان چې د وینې گردش عکس العمل ته تمایل او فوري حساسیت ولري، باید له واکسین کولو وړاندې ډاکټر ته پدې اړه ووايي.

د واکسین څخه وروسته ممکن خايي او عمومي عکس العملونه

له واکسین څخه وروسته، له ناروغۍ څخه د پام وړ مصونیت او ژغورني تر څنګ، له واکسین شویو کسانو څخه شاوخوا 10% بنیادي د واکسین په ځای کې له سوروالي یا درد لرونکي پړسوب سره مخ شي. دا له واکسین سره د بدن نورمال تعامل دی او معمولاً له 1 څخه تر 3 ورځو موده کې رامنځته کیږي او ډیر کم تر اوږدې مودې پورې دوام کوي. په ډیرو کمو مواردو کې شاوخوا د پړسوب غوټې راپورته کیږي. عمومي نښې یې لکه له نرمې څخه تر منځني تبي پورې، سړي تودې تبي، سردردې او د بدن په غړو کې درد (د عضلو او بندونو درد)، یا ډیر کم د سترتیا احساس گڼل کیږي. ددې سربیره، بنیادي د خپټې درد او د معدې گاز (زړه بدیدل، قی او اسهال) بې نظمي رامنځته شي. له واکسین څخه وروسته د ځیگر د انزایم ارزښت لوړیدل ډیر کم لیدل کیږي. په عمومي ډول، پورته یاد شوي عکس العملونه موقتي وي او د نورو پایلو پرته ډیر زر له منځه ځي.

آیا له واکسین څخه وروسته مونږ ته د ستونزو رامنځته کېدو امکان شته؟

واکسین ډیر کم داسې عواقب لري چې د واکسین عکس العمل له نورمالې درجې څخه پورته لار شي. دوی د واکسین شوي کس په روغتیا باندې بیلایلي ځانگړي اغیزې لري. په انفرادي مواردو کې، د عصبي سیستم عواقب (د بیلګې په ډول، عصبي التهاب، موقتي فلج) او د پلاکت په شمیر کې کموالی بیان شوي دي؛ له واکسین سره نسبي اړیکه د بحث او شک وړ ده.

د ممکنه جانبي اغیزو په اړه د واکسین ورکونکي مشوره

ددغې معلوماتي لیکنې سربیره، ستاسو ډاکټر به تاسو ته مشوره درکړي. څرگنده ده چې که چېرې له واکسین وروسته علایم له پورته یاد زر له منځه تلونکو، موقتي خايي او عمومي عکس العملونه څخه ډیر وخت نیسي. واکسین ورکونکی به هم تاسو ته د مشورې ورکولو پر مهال موجود وي. تاسو کولی شئ چې ډاکټر ته لاس رسې پیدا کړئ.

بي واكي

ددغي معلوماتي ليكني اصلي پاڼه (نسخه 10/2014) د Deutsches Grünes Kreuz e.V په اجازه د رابرت كوچ انسټيټوت لپاره ژباړل شوي وه. جرمني ژبه د ليكني اصلي نسخه ده؛ په ژباړي كې د تيروتنې لپاره، او هم د جرمني ژبې په اصلي نسخه كې د هر ډول وروسته بدلون په صورت كې د اوسني ژباړي په اصلاح شوي نسخې كې هيڅ ډول مسؤليت په غاړه نه اخيستل كيري.

نوم

Name

له هېپاتیتیس B پر وړاندې د خونديتوب واکسین

Schutzimpfung gegen Hepatitis B

مهرباني وکړئ دلته له هېپاتیتیس B څخه د ژغورنې واکسین په اړه د معلوماتو پاڼه ترلاسه کړئ. په دغه پاڼه کې د واکسین په واسطه د مخنیوي وړ ناروغی، واکسین، واکسین کولو، د واکسین عکس العملونو او د واکسین ممکنه عواقبو اړوند معلومات ورکړل شوي دي.

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis B. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplicationen enthalten.

له واکسین کولو څخه وړاندې د لاندې معلوماتو غوښتنه کيږي:

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten:

1. آیا دغه کس چې واکسین کيږي صحت مند دی؟

Ist der Impfling gegenwärtig gesund?

نه (nein)

هو (ja)

2. آیا دغه کس چې واکسین کيږي کومه څرگنده الرجی یا حساسیت لري؟

Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt?

نه (nein)

هو (ja)

که چیرې هو، کومه

wenn ja, welche

3. آیا دغه کس چې واکسین کيږي له تیر واکسین څخه وروسته د الرجی علایمو، سختې تبې، نورو غیر معمول عکس

العملونو سره مخ شوی دی؟

Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?

نه (nein)

هو (ja)

که چیرې له هېپاتیتیس B څخه د ژغورنې واکسین په اړه نور معلومات غواړئ د واکسین له ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ!

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis B wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt!

کله چې د واکسین بلې لیدنې لپاره راځئ مهرباني وکړئ خپل د واکسین کتابچه د سره راوړئ!

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!

د رضایت اعلامیه

Einverständniserklärung

د هپاتیتیس B پر وړاندې د مخنیوي واکسین ترسره کولو لپاره
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis B

د هغه کس نوم چې واکسین ورکول کېږي

Name des Impflings

د پېداېښت نېټه

geb. am

ما د معلوماتو پانې ټول ټوکي لوستلي او پرې پوه شوی يم او زما ډاکټر د بحث پر مهال ماته واکسین په پوره جزئیاتو تشریح کړ.
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden.

زه اضافي پوښتنې نه لرم

Ich habe keine weiteren Fragen.

زه د هپاتیتیس B پر وړاندې وړاندیز شوي واکسین سره رضایت لرم.

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis B ein.

زه له واکسین کولو څخه ډډه کوم. زه ددغه واکسین څخه د ډډې کولو په ممکنه زیانونو پوهیږم.

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert.

نظر

Vermerke

ځای، نېټه

Ort, Datum

د ډاکټر لاسلیک

Unterschrift des Arztes/der Ärztin

د هغه کس چې واکسین تر لاسه کوي یا د سرپرست

لاسلیک

Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten